



Bibliothèque
ÉMILE B



Catalogue N

Provient de

Livres

40K32.5

.B5



DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

71B
SICULARUM PLANTARUM

CENTURIA PRIMA 3

ANTONINI BIVONA BERNARDI ACCADEMIAE
ECONOMICAE FLORENTINAE SOCI
CORRESP. —

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PANORMI

APUD PHILIPPUM BARRAVECCHIA.

M. DCCC. VI.

SECTIO PRIMA

DE PRINCIPALI

ANALYSIS PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

DE PRINCIPALI

PRAESTANTIBUS DOCTRINA VIRIS
IN REGIA PANORMITANA UNIVERSITATE
DOCENTIBUS.

JOSEPHO PIAZZI ASTRONOMIAM
CANONICO ROSARIO GREGORIO JUS PUBLICUM
SICULUM.

DOMINICO SCINA' PHYSICAM
EXPERIMENTALEM.

QUI LUMINA ET ORNAMENTA SICILIAE
AUCTOR.

HAS PRIMAS EJUS LUCUBRATIONES.

D. D. D.

TRANSATLANTIC DOCTRINE
IN RACIAL AND NATIONALITY

THEORY

JOSEPH H. H. H. H.

CHAMBERLAIN, EDWARD

1891

DOCTRINE OF THE

THEORY

CHAMBERLAIN, EDWARD

1891

DOCTRINE OF THE

THEORY

Naturâ pene ipsâ ad Botanicæ studium ductus, in id maxime operam conferre arbitratus sum ut patrias indígenasque plantas, quod est omnium ingenium ut sua quemque magis delectent, illustrandas explanandasque aggrederer. Itaque, cum illud opus in dies augeri viderem, excerpta quaedam in lucem edere constitui; quorum quidem nunc primam habes *Centuriam*, quam & pleraeque aliae excipient, quae postea in unum collectae *Siculam Floram* constituent.

Siciliam jamdiu multimodis plantarum speciebus uberem esse, et fama testatur, et Paulus Boccone, Franciscus Cupani et An-

Aug 7 - 1923
 Bot. Garden
 Gen.

LIBRARY
 NEW YORK
 BOTANICAL
 GARDEN

tonius Bonanni suis editis operibus hanc illi laudem jure optimo tributam confirmarunt. Quae in lucem edidit Boccone, ipsa per se nota sunt: quae reliqui duo, adeo res videtur obstricta difficultatibus, ut hujus loci alienum non putem in eâ re evolvendâ paulum immorari.

Pater Franciscus Cupani tertii ordinis S. Francisci Assisiensis semel et iterum magno labore peragratis omnibus Siciliae plagis, plurimisque novis detectis plantis, quarum nomina amplo catalogo *Horti Catholici* recensuerat, cum jam in eo esset ut *Panphyton Siculum*, quod novem et decem annos sedulo elaboraverat, opus perficeret, adverso Siciliae fato anno 1711. e vita decessit. Neque multo post Catholicae Princeps, qui Botanicis in rebus et aures et judicium praebere poterat, quique elegantiorē hanc Historiae Naturalis par-

tem haud parvo sumptu coluerat et promoverat, occubuit. Illius autem operis complura tabularum centena aere cusa remanserunt; et ut res ipsa fert, sibi que quisque facile persuadere potest, scripta quaedam remansisse necesse est; verum ea quae sint, quisve ea possideat, latet: ego meâ quidem sententiâ censeo, illa esse eadem sexdecim volumina in quarto, quae Franciscus Chiarelli servat accuratè, quaeque septem et decem abhinc annis se in lucem editurum pollicitus est perinde ac si opera essent Vincentii et Antonii Bonanni (a). Neque in hanc conjecturam

(a) „ e si fecero ammirare le celebri fatiche metodiche de' Sig. Bonanni sù quasi tutti i vegetabili di Sicilia manoscritte in sedici volumi in 4. I meriti e le molte scoperte tanto di Vincenzo Bonanni Padre, che di Antonio suo figlio amendue autori di così insigne opera, esigerebbero in questo luogo particolari encomii. Io ho creduto ben fatto vantandogli nel numero de' miei maggiori non dirne di più, aspettandone un

fortasse non contemnendam temerè lapsus sum:
 Cum enim mihi ea volumina versandi, quod
 semel contigit, data est facultas, facile fuit
 animadvertere, methodum quâ res digestae
 sunt, eandem planè esse, quam Cupani in Prae-
 fatione *Horti Catholici* se sequuturum prae-
 monuerat, cum de suo Panphyto verba fa-
 ceret. Caeterum, utcunque se res habeat,
 earum quas paulo ante Panphyti tabulas com-
 memoravi, perpauca adhuc extant exempla-
 ria post Cupani mortem in lucem edita, quo-
 rum unum paucis abhinc annis fortè reper-

più sincero ed imparziale giudizio della gente
 dotta, quando avrà letto le fatiche degli anzi-
 detti trascritte nell'intero corpo di quella Sto-
 ria Naturale di Sicilia, che fra breve attese le
 moltissime fatiche e considerabili spese di D. Giu-
 seppe Chiarelli mio Padre, sarà per comparire
 al Pubblico ben compita in tutto il vasto dise-
 gno, che si era da nostri proposto,, V. *Chiarel-*
li Discorso che serve di Preliminare alla Storia
 Nat. di Sicilia Palermo 1789.

tum, publicae ut par erat, addictum est utilitati. Hoc exemplar Panormi extat in Regia Bibliotheca apud Patres Societatis Jesu, tribus constans voluminibus in 4., quorum primum et secundum Regnum vegetabile majori ex parte respiciunt; tertium, si nonnullas excipias plantas, complectitur plerasque figuras affabrè delineatas plurimum animalium, pisces, volatilia, polypos, aliaque id genus.

Vita functo Cupani aliud opus ab Antonio Bonanni confectum in lucem prodidit, quod est collectio 198 tabularum, illudque praedictus Chiarelli ut quartum *Panphyti Siculi* volumen habuit (a). Quibus autem rationibus adductus, ego sane non intelligo, quin

(a) „ Questa tanto degna opera del Cupani divisa in quattro volumi fù dunque pubblicata in Palermo l'anno 1713. , Chiarelli &c.

imo si quae proxima sequuntur attendas, facile patebit, ejus de hac re judicio acquiescendum non esse.

Pater Cupani Antonio Bonanni Vincentii Filio familiarissimè usus est, eumque in Botanices studio sibi erudiendum suscepit; qui cum esset ingenio plus quam par est, ut levissimè dicam, laudis cupido, tantum abfuit ut Cupani jam vita functo gratum animum praestiterit, quin potius, quas summo studio perficiendas ille curaverat tabulas, hic nullo pene labore suas facere contenderit, nullaeque sibi duxerit religioni ex diruto praeceptoris opere suam sibi laudem comparare. Id ut assequeretur effecit ut, dum sub typis esset Pampyti opus, supersederetur, causam interserens plerasque tabulas parum concinnè effectas easque correctione indigere. Quae causa fuit quamobrem exemplaria tam pauca ad nos per-

venerint. Itaque cum contigisset, quod ei maxime fuerat optatum, ut eas corrigendas tabulas ipse susciperet, parvo tempore elapso 1798. tabulas in lucem edidit, alias deprompturus, si ejus consilia mors non abruptisset. Sed has ab ipso editas, easdem esse quas antea Cupani protulerat, paucis vafre mutatis in iis praecipue quae plantarum nomina respiciunt, nemo est qui non videat. Quae omnia si diligentius animadvertantur fateri necesse est, illud Bonanni opus tantum abesse quin Panphyto quartum veluti volumen adsciscatur, ut potius turpe plagium censendum sit.

Post Cupani & Bonanni tempora, quibus Botanices studium in hac Insula vehementius colebatur, nemo fuit qui in hac Historiae Naturalis provincia aliqua cum laude operam navarit, deque ea re quidquam me-

moriae dignum in lucem protulerit. Nonnulli Horti Botanici, quos homines privati aere proprio posuerunt, labente tempore vel neglecti vel penitus evulsi. Nobis datum est ut his temporibus unum tantummodo cerne-remus Panormi positum Regiis opibus amplum sane et magnificum, cujus in definien-dis plantis nonnulli errores irrepsere, quos et veritatis amor et liberus meus animus fe-cerunt, ne tacitos relinquendos putarem, sed operae praetium duxerim aperire.


Hoc monitum velim, methodum quam ego sequutus sum hanc fuisse, ut in recen-sendis jam cognitis plantis aptiori uterer phrasi specifica, quam vel in Linnaeo repe-rerim vel in recentioribus Botanicis; ubi ve-ro nec satis idonea nec opportuna visa est, novâ usus sum, quam magis rei convenire ju-dicavi. Quod ad Synonymiam spectat satis

habui, citationes necessarias adducere, quae
 plantae naturam apertè significarent. Cum
 mihi necesse fuit ab alicujus auctoris senten-
 tia discedere, rationes persequutus sum, quae
 meum animum induxerint. Postremo quod ad
 novas spectat stirpes, earum novitatem con-
 testari studui easque latioribus descriptionibus
 illustrare, quin etiam et nonnullarum figuras
 Fuchsiano modo insculptas prodidi.

Tanto quod susceperim oneri satis ne
 sim, vereor: aequi rerum aestimatores mihi
 liquido dabunt, melius esse nonnihil, quam
 nihil audere.

*Est quoddam prodire tenus si non datur
 ultra Horat.*

Dabam Panormi die
 18. Sept. 1806.



1. *Andropogon hirtum*: culmo ramoso, paniculae spicis conjugatis, calycibus pilosis.

Andropogon hirtum Sp. pl. 1482. -- *Savi*
Due Cent. p. 205. cum bona descriptione -- *Ber-*
toloni Pl.Gen. p. 135.

Gramen dactylon spicis ab eodem exortu
 geminis. *Bocc. Mus. fis.* p. 315. 28. f. 1.

Gramen polydistachyophoron lanuginosum
Bonan. 1.5. -- *Cup. Hort. Cath.* p. 90. et *Suppl. alt.*
 p. 33.

Gramen dactylon spicâ geminâ *Scheuchz.*
Agrost. p. 95. exclus. synonym. *J. B. et Bocc. quae*
ad Ischaemum et distachyon spectant.

Gramen Dactylon Siculum multiplici pa-
 niculâ spicis ab eodem exortu geminis. *Pluk.*
Alm. 175. 1. 92. f. 1.

Pedunculi hirti uti et rachis et glumae.
 Vaginae ad divisiones culmi paulum inflatae.
 Flores hermaphroditi sessiles, aristati; mas-
 culi pedunculati, mutici.

In pascuis sterilibus montosis maritimisque . Panormi sotto Santu Spiritu .

2. *Agrostis pungens* : paniculâ coarctatâ muticâ ; foliis involutis rigidis subulatis , culmo ramoso repente .

Agrostis pungens Lam. Dict. 1. p. 59. -- *Poirer It.* 2. p. 94. -- *Savi Pis.* 1. p. 84. -- *Desf. Atl.* 1. p. 68. -- *Cavanil. Ic.* t. 3. -- *Schreb. Gram.* 2. p. 46. t. 27. f. 3.

Agrostis virginica L. Will. sp. 1. p. 373.

Gramen caninum maritimum spicatum
C. B. Prod. 2. Pin. 1.

Gramen caninum marinum pumilum graminis filicini paniculis in spiculam compactis
Cup. Panph. 1. t. 176. -- Bonan. t. 1.

Gramen caninum pumilum spicâ compactâ
Cup. Hort. Cath. p. 89. et Suppl. alt. p. 34.

In arenosis maritimis . Panormi dopo Mustazzola .

3. *Allium album* : umbellâ capsuliferâ , staminibus simplicibus , scapo nudo triquetro , foliis radicalibus lanceolatis carinatis .

Allium album Santi Viag. al Montam. p.
 352. tav. 7. -- *Bertol. Pl. Gen. p. 51.* -- *Savi Pis. I. p.*
 340.

Facies sequentis, sed procul ullo dubio species diversa ex scapi triquetri angulis duobus acutis, altero obtuso, petalis albis absque linea dorsali viridi, antheris viridibus, foliis lanceolatis nec valdè carinatis.

In campis. Panormi dietro S. Francesco di Paola fra li ficu d'Innia di Cannatedda

4. *Allium triquetrum*: scapo nudo foliisque triquetris, staminibus simplicibus.

Allium triquetrum Sp. pl. 431. -- *Savi Pis. I. p. 346.* -- *Bertol. Pl. Gen. p. 51.*

Scapus argutè triqueter. Petala alba, dorso linea viridi. Antherae luteae. Folia costâ prominente subtriquetra.

Prope Panormum alla Grazia

5. *Allium subhirsutum*: caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis.

Allium subhirsutum Sp. pl. 424. -- Desf. Atl. I. p. 286.

Moly *Matt. Comm.* 544. -- *Camer. Epit.* 498.

Moly angustifolium umbellatum *Cup. Hort. Cath.* p. 146.

Allium saxatile album angustifolium hirsutum *Cup. Panph.* 1. 2. 2.

Panormi sul Monte di S. Maria di Gesu

6. Allium *roseum*: caule planifolio umbellifero, umbellâ fastigiatâ, staminibus simplicibus corollâ brevioribus, petalis emarginatis.

Allium *roseum* *Sp. pl.* 432. -- *Desf. Atl.* 1. p. 237. -- *Foiret It.* 2. p. 145. -- *Viviani Fragm. ap. An. Bot. vol.* 1. part. 2. pag. 165.

Allium caule planifolio umbellifero, umbellâ fastigiatâ filamentis simplicibus basi dilatatis *Ger. Prov.* p. 150.

8. Idem umbellâ bulbiferâ

Allium *carneum* *Targ. Tozz. Ist. Bot. ed.* 2. tom. 2. p. 242. t. 6. f. 304. -- *Bertol. Pl. Gen.* p. 51. -- *Savi Duecent.* p. 87.

Moly angustifolium campanulatum flore roseo nodosum *Cup. Panph.* 2. t. 219.

Moly-serpentinum vocatum *Lob. Ic.* p. 190.

Varietas β minus frequens.

Reperi in montibus *S. Martini*.

7. *Allium chamaemoli*: scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, foliis planis ciliatis.

Allium chamaemoli *Sp. pl.* 433. -- *Desf. Atl.* 1. p. 288. -- *Cav. Ic.* 3. t. 207. f. 1. -- *Poir. It.* 2. p. 146.

Chamaemoli an *Moly Dioscoridis* *Col. Euphr.* 1. p. 326.

Allium acaule seu humi in superficie florens gramineo folio hirsuto *Cup. Panph.* 1. t. 242.

Moly humile folio gramineo *Cup. Hort. Cath.* p. 147.

In pascuis sterilioribus. *Panormi fuori Porta Riali*, etiam *alli Cruci*.

8. *Arabis alpina*: foliis amplexicaulibus, dentatis.

Arabis alpina *Sp. Pl.* 928.

Turritis verna *Desf. Atl.* 2. p. 92.

Draba alba siliquosa *Cup. Hort. Cath.* p. 66.

Drabae secundae *Clusii* exactior icon *Cup. Panph.* 1. t. 106.

Leucojum vernum perenne album majus *Bonan.* t. 65.

In pascuis montosis elatis. Prope Carenim
sepra Muntagna longa.

9. *Arabis thaliana* : foliis pilosis subdentatis : radicalibus petiolatis , caule ramoso , siliquis ascendentibus .

Arabis thaliana Sp.pl.929.-- Smith. Brit.2.p.712.-- Curt.Lond.Ic. -- Savi Pis.2.p.105. -- Pollich Palat. 2.p.243.t.4

Drabula minima alba , foliolis oblongulis , juxta terram in orbiculum compactis *Cup.Hort. Cath.p.67.*

Turritis vulgaris ramosa *Cup.Panph.2.t.141.*

In aggeribus , muris et ad vias .

10. *Biscutella raphanifolia* : foliis lyratis , siliculis glabris :

Biscutella raphanifolia *Poiret It. 2. p.198.*
Desrousseaux Dict.3.p.619. -- Desf.Atl.2.p.74.

Thlaspi biscutatum raphani aut *Irionis* folio *Bocc.Sic.p.45. t.23.-- Cup.Panph.1.t.194.*

Thlaspidium Raphani folio *Bonann. t.59.*

In pratis et pascuis. Panormi *Nel piano della Cunsulazioni ,*

11. *Biscutella lyrata* : foliis lyratis , siliculis scabris.

Biscutella lyrata Mantis. 254. -- *Poiret It. 2. p. 197.* -- *Desrousseaux Dict. 3. p. 619.*

Herba magnitudine varia . Caules purpurascetes , plerumque supernè , basi interdum etiam ramosi atque foliosi , foliis sessilibus pinnatifidis . Folia caulina superiora brevissima , linearia , ciliata . Siliculæ orbiculato-didymae , pilis brevibus costanter hirsutae , qua nota certo certius Linnaeanam speciem hanc esse dignoscitur .

In pratis et pascuis . Panormi tra la Guadagna , e Santu Spiritu .

12. *Bromus ligusticus* : paniculâ nutante secundâ ; spiculis linearibus , valvulâ calycinâ alterâ vix conspicuâ , pedicellis clavatis .

Bromus Ligusticus. *All. Fl. Ped.* -- *Viviani Fragm. ar. Ann. Bot. p. 145.*

Gramen bromoides Festuceâ tenuique paniculâ minus *Scheuch. Agrost. 296. t. 6. f. 13.*

Aristae terminales . Glumae interiores setis erectis minutè ciliatae , acutae , bidentatae .

Prope Panormum *alla Grazià* locis gramineis

13. *Cardamine hirsuta*: (a) foliis pinnatis extipulatis: foliolis petiolatis; inferioribus subrotundis, superioribus lanceolatis.

Cardamine hirsuta. *Sp.pl.* 915.-- *Curtis Lond.Ic.*--*Santi Viag.al Mont.p.249.*--*Savi Pis.2. p.96.*--*Bertol.Pl.Gen.p.78.*

Sisymbrium aquaticum alterum Camer. Epit.270.

Cardamine sylvestris minor italica Barr. Ic. 455.

Herba magnitudine varia, magis vel minus hirsuta, petiolis saltem infernè ciliatis. Flores interdum tetrandri.

In cultis humidis. Panormi *nella Flora*

(a) *Cardamine pratensis Synopsis Plant.Horti Botanici Accademiae Regiae Panormitane*

14. *Carex divulsa*: spicâ elongatâ subdecompositâ, basi subramosâ, spiculis inferioribus remotis, fructibus erectiusculis, margine laeviusculis.

Carex divulsa. *Good. Trans. of. Lin. Soc. p.*
180. -- *Bertol. Pl. Gen. p. 127.* -- *Smith. Brit. 3. p. 975.*

Gramen cyperoides palustre gracile trigonum intervallatâ spicâ *Cup. Panph. 2. t. 46.* -- *Hort. Cath. p. 90. et Suppl. alt. p. 34.*

Cyperoides palustre gracile intervallatâ, spicâ *Bonan. 2. 11.*

Carex nemorosa, fibrosâ radice, caule exquisitè triangulari, spicâ longâ, divulsâ seu interruptâ, capitulis omnibus solitariis *Mich. Gen. 69. t. 33. f. 11.*

Carex nemorosa, fibrosâ radice, caule exquisitè triangulari, spicâ longâ divulsâ seu interruptâ, capitulis solitariis praeterquam ultimo *Mich. ibid. f. 10.*

In gramineis siccis. Panormi *ulla Grazia.*

15. *Carex vulpina*: spicâ supradecompositâ coarctatâ obtusâ, fructibus divergentibus, glumis acuminatis, culmi angulis compressis acutissimis.

Carex vulpina. *Sp. pl. 1382.* -- *Good. loc. cit. p. 161.* -- *Smith Brit. 3. p. 976.* -- *Savi Pis. 2. p. 323.* --

Leers Herbor. p. 196. t. 14. f. 5. — Gaertn. t. p. 12. tab. 2. f. 6.

Gramen cyperoides palustre majus triquet-
ter spicâ minus compactâ *Cup. Panph. 2. t. 46.*
-- *Hort. Cath. p. 90.*

Cyperoides palustre majus spicâ compactâ
seu Gramen cyperoides palustre triquetrum spi-
câ integrâ *J. B. Bonan. t. 11.*

Carex palustris major radice fibrosâ cau-
le exquisitè triangulari, spicâ brevi, habitio-
ri, compactâ *Mich. Gen. 69. t. 13. 14.*

Ad fossas. Prope Carenim *alli margi*

16. *Carex divisa* : spicâ subdecompositâ spiculis
omnibus androgynis, bracteâ foliaceâ erectâ,
fructibus adpressis, radice repente.

Carex divisa. Good. loc. cit. p. 157. t. 19. f. 2.

Smith. Brit. 3. p. 973.

Carex hybrida. Lam. Dict. 3. p. 382.

Carex cuspidata. Bertol. Pl. Gen. p. 126.

Gramen cyperoides minus paniculâ par-
vâ, arundinaceâ radice *Cup. Suppl. alt. p. 33.*

Cyperoides minus paniculâ parvâ arun-
dinaceâ radice *Bon. t. 130.*

Carex alpina minima ; caule trilatelo ,
 capitulis in summitate caulis atro fuscis , squa-
 mis angustis , capsulis non marginatis in lon-
 giusculum collum magis bifidum attenuatis
*Michx. Gen. 68. n. 5. t. 33. f. 6. etiam ex ejusdem Her-
 bario*

In palustribus maritimis , etiam in mon-
 tosis siccis . Prope Carenim vicino li margi

17. *Carex pendula* : vaginis elongatis pendunculo
 subaequalibus , spicis cylindricis , longissimis , nu-
 tantibus , fructibus confertissimis , ovatis , acu-
 tis .

Carex pendula . *Good. loc. cit. p. 168. -- Curt.*
Lond. Ic. -- Smith. Brit. 3. p. 981. -- Bertol. pl. Gen.
p. 129.

Carex maxima . *Savi Pis. 2. p. 325. -- Desf. Atl.*
2. p. 338. -- Lam. Dict. 3. p. 394.

Cyperoides spica pendula longiore et an-
 gustiore *Scheuch. Agrost. p. 445.*

Gramen cyperoides palustre , maximum
 triquetrum spicis longissimis pendulis denti-
 culatis *Cuf. Panph. 2. t. 46.*

Gramen cyperoides palustre latifolium spicis denticulatis pendulis longilatifolium Cup. Hort. Cath. p. 90. et Suppl. alt. p. 34.

Cyperoides palustræ latifolium spicis denticulatis pendulis longioribus et angustioribus Bonan. t. II.

Gramen cyperoides latifolium typhâ pendulâ longiori Barr. Ic. 45.

Ad Ripas fossarum .

18. *Carex gynobasis* : vaginis subnullis , spicis foemineis paucifloris , inferiore pedunculatâ radicali , fructibus obovato-triquetris nervosis .

Carex gynobasis Sehk. Hist. Car. p. 92. t. G. f. 35. -- Berto l. Pl. Gen. p. 131.

Carex alpestris . All. Ped. 2. p. 270.

Carex rhyzanta . Gmelin Syst. p. 144.

Habitat in montibus S. Martini

19. *Cnicus pungens* : (a) foliis decurrentibus subtus lanuginosis pinnatifidis spinosis , floribus racemoso-glomeratis , squamis calycinis ovatis spinosis , spinis pungentibus .

Cnicus pungens L. Willd. 1663.

Carduus palustris altissimus, lanceato folio, ramosus, caule folioso, spinosissimus, capitibus compactis *Cup. Hort. Cath. p. 36.*

Carduus palustris altissimus lanceolatus pycnopolycephalus. *Cup. Panph. 1. 2. 166.*

In stagnis, et ad fluviorum vel rivulorum margines vulgaris.

(a) *Carduus palustris Syn. H. R. P.*

20. *Colchicum variegatum*: foliis undulatis patentibus, petalis elliptico-lanceolatis, variegatis.

Colchicum variegatum Sp: pl. 485.

Colchicum chionense, floribus fritillarise instar tessulatis, foliis undulatis *Moris. Hist. 2. p. 341. Sec. 4. 7. 3. f. 4.*

Colchicum commune Cup. Hort. Cath. p. 54. et Suppl. alt. p. 20.

Bulbus subrotundus magnus solidus albus tunicâ fuscâ striatâ tectus, hinc sulcatus, sulco spatham 1-4 florum semiamplexenti. Flores subradicales, foliis precociore, tessellis albis purpureisque pulcherrimè variegati, tubo albo

longo. Antherae versatiles intensè purpureae dissepimento albo. Pollen luteum. Stigmata truncata. Folia et fructus adhuc non vidi.

Reperi in montibus *S. Martini* precipuè sopra Munti pitrusu, etiam sopra *S. Maria di Gesu*.

21. *Coris monspeliensis*.

Coris monspeliensis *Sp.pl.* 252.-- *Desf. Atl.* 1. p. 185.-- *Lam. Illustr. n.* 1996. t. 102.-- *Savi Due cent.* p. 56.

Coris coerulea maritima *Cup. Hort. Cath.* p. 59.

Coris monspeliaca *Loß. Ic.* 402.

Prope Panormum sopra *S. Maria di Gesu*.

22. *Coronilla valentina*: fruticosa, foliolis subnatis, stipulis suborbiculatis.

Coronilla valentina *Sp.pl.* 1047.

Coronilla stipularis *Lam. Dict.* 2. p. 120.

Colutea scorpioides altera minor securidicae folio auriculato *Cup. Panph.* 1. t. 41.

In montosis siccis. Panormi sopra *S. Maria di Gesu*.

23. *Crepis bursifolia* : caule paucifloro subaphyllo,
foliis radicalibus pinnatifidis, dentatis, pappo
stipitato

Crepis bursifolia *Sp.pl.* 1131. *excl. syn. Cup.*

Hieracium siculum *Bursae pastoris folio*
Bocc. Mus. p. 147. t. 106. & 112.

Hieracium Panormitanum *Bursae pastoris*
folio *Cup. Panph. 2. t. 215. -- Bonan. t. 139.*

Radix fusiformis. Caules 3-5 unciales teretes, debiles, pauciflori, adscendentes, simplices vel parum ramosi, lanulâ albâ rarâ deciduâ subtomentosi, deinde ferè glabri. Folia glabra: radicalia petiolata, pinnatifida lobis directione et sitû variis, terminali semper dentato, aliquando ciliata costâ pilosiusculâ; caulina inferiora, si adsunt, sessilia, lanceolata, basi dentato-pinnatifida; superiora linearia, integerrima. Pedunculi terminales, elongati, saepe bracteolati, bracteâ lineari. Flores citrini, parvi, matutini, ligulis apice quinquedentatis, dorso purpurascens. Calyx plus minus tomentosus, simplici serie polyphyllus, foliolis

subaequalibus, dein carinatis semina marginalia amplectentibus, margine membranaceo, squamis linearibus, brevibus, appressis. Semina flava, sulcata, angulis scabra. Pappus simplex, stipitatus, oculo armato scaber. Receptaculum favosum.

Floret Julio-Sept.

Panormi *ad vias frequens solo calcareo*

24. *Cynosurus cristatus*: bracteis pinnato-distichis, muticis, spicâ simplici, lineari.

Cynosorus cristatus Sp. pl. 105. -- Schreb.

Gram. 69. t. 8. f. 1. -- Leers Horbor. p. 49. t. 7. f. 4. --

Lam. Illustr. n. 1092. t. 47. f. 1. -- Savi Pis. I. p. 110.

Gramen pratense cristatum, seu spicâ cristatâ laevi *Schecz. Agrost. p. 79. t. 2. f. 8. A.C.*

Gramen spicâ cupressiformi asperâ cristatâ *Cup. Panph. 2. t. 59. -- Bonan. t. 4.*

Gramen spicâ cupressiformi asperâ *Cup. Hort. Cath. p. 90.*

In pascuis vulgaris. Prope Panormum *ad la Grazia.*

25. *Cyperus distachyos*: culmo subtriquetro filifor-

mi, basi monophyllo; spiculis subgeminis sessilibus, involucris foliolo altero brevioribus.

Cyperus distachyos Wild. *Sp. Pl.* p. 272. — *All. Auct.* 48. t. 2. f. 5.

Cyperus junciformis Cav. *Icon.* 223. t. 204. f. 1. — *Desf. Atl.* 1. p. 42. t. 7. f. 1. — *Lam. et Decand. Fl. Franc.* v. 3. p. 144.

Juncellus Cyperi paniculis binis vel ternis nigris *Cup. Panph.* 2. t. 123.

Junculus paniculâ duplici. nigrâ *Cup. Hort. Cath.* p. 104.

In glareosis inundatis.

26. *Dianthus rupicola*: floribus aggregatis, fasciculatis, squamis calycinis imbricatis, brevibus, margine ciliatis; caule suffruticoso.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius floribus conglobatis sive copulatis *Cup. Hort. Cath.* p. 40.

T. 1. Caules suffruticosi a pede ad sesquipedem usque alti, ramosissimi: ramis inferiori parte nudis, annulatis, superiori foliosis, apice multifloris. Folia crassiuscula, lineari-lan-

ceolata, glauca, glabra, integerrima, enervia;
 basi parum connata. Flores congesti, rosei, o-
 dori. Calyx laeviter striatus, basi cinctus squa-
 mis numerosis arcuè imbricatis, tubo triplo
 circiter brevioribus, ellipticis, aristatis, mar-
 gine ciliatis. Petala serrata, ore lineata pu-
 bescentia pilis purpurascens; ungue albo.

Habitat in fissuris rupium.

27. *Dianthus saxifragus*: floribus solitariis; squa-
 mis calycinis binis vel quaternis margine mem-
 branaceis, petalis emarginatis, foliis lineari-
 bus.

Dianthus saxifragus Sp. Pl. 1. 413.

Dianthus filiformis Lam. Fl. fr. 2. p. 537.

Gypsophyla saxifraga Sp. pl. 2. 584.

Betonica coronaria v. *Tunica minima* J. Bauh
 Hist. 3. p. 337.

Lychnis pumila caryophyllata, flore ru-
 bello, *Italica Haemorrhoidalis* Aldrevando Barr.
 Ic. 998.

Caryophyllus minimus procumbens angu-
 stissimo folio incarnatus Cup. Panph. 2. t. 21.

Caryophyllus sylvestris minimus *Cup. Suppl.*

alt. f. 16.

In apricis petrosis vel maritimis arenosis.

28. *Delphinium peregrinum*: trigynum; foliis inferioribus multipartitis, obtusis; superioribus simplicibus; corollis heptapetalis; nectariis geminis.

Delphinium peregrinum *Syl. 749.* -- *Desf.*

Atl. 1. f. 426.

Consolida regalis latifolia parvo flore *C. B.*

Prod. 74.

Consolida regalis montana dilutè flore coeruleo *Cup. Panph. 1. t. 118.*

Delphinium arvense sive montanum flore dilutè coeruleo *Bonan. t. 25.*

In arvis et campis precipuè montosis. *Panormi sopra S. Maria di Gesu*

29. *Erica multiflora*: antheris muticis styloque exsertis, corollâ campanulatâ, foliis quinis, floribus axillaribus, pedunculis flore longioribus.

Erica multiflora *Syl. 503.* -- *Savi Due cent.*

f. 96.

Erica foliis corios multiflora *Jo. Bauh. Hist.*

1. p. 356.

e

30. *Eryngium tricuspidatum* : foliis radicalibus cordato-subrotundis, inciso-dentatis, caulinis multipartitis, laciniis linearibus, paleis tricuspidatis.

Eryngium tricuspidatum Sp.pl.337.-- Desf.

*Atl.*1.f.224.

Eryngium Bocconi Lam. *Di&*4.p.754.

Eryngium capitulis psyllii ex Sicilia Bocc. *Sic.*88.t.47.-- Cup. *Panph.*2.t.202. *Hort. Cath.*p.70.

In pascuis montosis maritimisque. Prope Panormum *all'Aspra*, a *Sferracavaldu*, e a *lu Caputu*.

31. *Euphorbia dendroides*: (a)umbellâ multifidâ bifidâ, involucellis rotundatis, capsulâ glabrâ, caule arboreo.

Euphorbia dendroides Sp.pl.662.?-- Lam.

*Di&*2.p.418.-- Desf. *Atl.*1.p.377.

Tithymalus dendroides major et verior *Barrel.*Ic.910.

(a) *Euphorbia nova* Syn. H.R.P.

35

32. *Euphorbia fruticosa*: (a) umbellâ quinquefida ,
bifida; involucellis diphyllis, obovatis, prima-
riis secundis; foliis lanceolatis glabris; cap-
sulâ verrucosâ.

Euphorbia spinosa Var. A *Desf. Atl.* 1. p.

380. f. 101.

Frutex tripedalis et ultra, ramosissimus,
ramis di-vel-tricothomis ad amplam panicu-
lam dispositis. Folia in ramulis terminalibus
floriferis congesta, uncialia, sparsa, lanceo-
lata, utrinque attenuata, integerrima, mollia,
glabra. Umbella ut plurimum quinquefida, ra-
diis bifidis, vix dichotomis, pedunculis axil-
laribus subjectis subnullis. Involucrum univer-
sale foliis ferè conforme. Involucella diphyll-
la, obovata, integerrima: primaria in singulo
radio secunda, in exteriorem umbellae partem
versa, reliqua per gradus subopposita. Flores
lutei. Nectarîa mutica, reniformia. Capsula
verrucosa, scabra.

Plantae hujus diversos status perpendi fa-
cta semper collatione cum *Euphorbia spinosa*

Lin. ; cui licet proxima ; attamen aliquibus notis constanter distare visa mihi est , praecipuè ramis di-trichotomis , foliis in ramis junioribus tantum sitis , umbellae radiis semel aut bis bifidis , involucellis secundis , obovatis. Malè ergo Icon Florae Atlanticae involucella ovata ac opposita repraesentat . Porro autem quod ad magnitudinem totius plantae spectat , individua plurima tripedalia et ultra locis sterilioribus siccioribusque , nempe in fissuris rupium orta , me vidisse assero.

Habitat cum praecedenti in montibus sterilibus , et ad fissuras rupium . Panormi sopra Monte Peregrino .

(a) *Euphorbia dendroides* Syn.H.R.P. ;

33. *Euphrasia rigidifolia* : foliis linearibus integerrimis scabris ; floribus racemosis secundis ; staminibus corollâ brevioribus ; antheris hirsutis .

Euphrasia autumnalis purpurea , vermicu-

lato, acuto, sulcato folio, deciduo *Cup. Hort.*
Cath. p. 70.

Euphrasia vermiculato folio deciduo Cup.
Panph. 2. t. 15.

Herba pilis brevibus rigidulis appressis tecta. Caules ad sesquipedem usque alti, obtusè tetragoni, purpurascens, raro lutei, paniculati, ramis oppositis, decussatis, adscendentibus, inferioribus patentioribus. Folia crassiuscula, linearia, opposita, glauca, integerrima, scabra, supernè plana, canaliculata sulco apicem non attingente, dorso striis longitudinalibus laevissimè exarata, costâ prominulâ. Flores racemosi, breviter pedicellati, bracteati, solitarii oppositi, decussati, per paria secundi. Bractee ovato-lanceolatae, fructus calyce breviores. Calyx cylindricus, striatus purpurascens, quadridentatus, dentibus acutis, subaequalibus. Corolla clausa, magnitudine Euphrasiae luteae, e luteo purpurascens, tubo calyce brevior. Labium superius emarginatum, obtusum, convexum, inferius trilobum, lobis subrotundis

integerrimis, medio lateralibus paulo majore, nunc apice emarginato, nunc integro. Stamina inclusa, corollâ breviora. Antherae luteae, hirsutae, hinc bilobae lobis omnibus apice mucronulatis, hinc pilorum fasce inter se connexae. Pollen luteum. Stylus corollâ longior incurvus. Capsula obovata compressa, emarginata, superne villosa, bilocularis, dissepimento valvis contrario, apice transversim dehiscens. Semina 6-8. in singulo loculamento ovato-oblonga, longitudinaliter striatâ.

Floret *Autumno*.

Reperi in Montibus *S. Martini*, et *alla Grazia nel feudo del Salvatore*.

34. *Fagonia cretica*: spinosa, foliis ternatis, foliolis lanceolatis.

Fagonia cretica *Sp.pl.* 553. -- *Desf. Atl.* 1. p. 338. -- *Lam. Illustr.* 2. 346. -- *Gaert.* 2. p. 153. t. 11.

Trifolium spinosum *Matth. Com.* 611. -- *Clus. Hist.* 2. p. 242. -- *C.B. Prod.* 142.

Reperi *nel Bosco del Cappidderi*.

35. *Festuca elatior*. paniculâ subdiffusâ mutante;

ramosissimâ laxâ , spiculis ovato-lanceolatis ,
acutis , flosculis cylindricis , obsoletè nervo-
sis.

Festuca elatior *Sp.pl.*111. -- *Schreb. Gram.*
34. t.2. -- *Leers Herb.*35. t.8. f.6. -- *Curtis Lon-*
don Ic. -- *Smith. Brit.*1.p.124. -- *Lam. Dict.*2.p.462.

Festuca pratensis *Lam. Dict.*2.p.460. -- *Savi*
*Pis.*1.p.112.

Festuca loliacea *Lam. Dict.*2.p.462.

Gramen arundinaceum locustis viridibus
spadiceis , loliaceis , brevius aristatis . *Scheuchz*
*Agrost.*p.266. t.5. f.18.

Gramen pratense altum paniculatum as-
perum latifolium paniculâ magnâ , multiplici
pendulâ. *Cup. Hort. Cath.*p.87.

In pascuis montosis.

36. *Festuca phleoides* : paniculâ spiciformi pubes-
cente , flosculis summis submuticis , inferio-
ribus aristatis , glumâ internâ florali bifidâ.

Festuca phleoides *Villars Dauph.* 2. p.95.
t.2. f.7. -- *Desf. Atl.*1.p.90. t.23. -- *Bertol. pl. Gen.*p.17

Poa phleoides *Lam. Ill.*n.976.

Bromus trivialis. *Savi Pis.* 1. p. 124. t. 2. f. 2.

Koeleria phleoides Pers. Syn. pl. p. 97.

Gramen typhoides molle Scheuchz. Agrost.
246. t. 5. f. 5.

Gramen alopecurum viridi et molli spicâ
Barr. Ic. 123. f. 1.

In campis & ad muros frequens.

37. *Fontinalis antipyretica*: foliis complicato-carinatis, trifariis, acutis, perichaetii foliolis obtusis, operculo subulato.

Fontinalis antipyretica Sp. pl. 1571. -- *Hedw. Sp. Musc.* 298. -- *Savi Pis.* 2. p. 413. -- *Lam. Illustr.* t. 873.

Fontinalis triangularis major complicata, e foliorum alis capsulifera. Dill. Musc. 254. t. 33. f. 1.

Muscus squamosus foliis acutissimis in aquis nascens. Vaill. Paris. t. 33. f. 5.

Muscus denticulatus aquaticus spicatus ramosus. Cup. Suppl. p. 249. & *Panph.* 1. t. 147. -- *Bonan.* t. 94.

Habitat in flumine Oreto.

38. *Geranium sanguineum*: pedunculis unifloris ; foliis quinquepartitis trifidis rotundatis ; capsulis apice setosis .

Geranium sanguineum . *Sp.pl.* 958. var. α -- *Smith Brit.* 2. p. 738. var. α -- *Bertol. Pl. Gen.* p. 82. -- *Sav. Pis.* 2. p. 111. -- *Cav. Ger.* t. 91. f. 1.

Geranium folio ex viridi fusco rotundo ; Delphynii prodeuntis incisuris , Geranii bulbosi flore *Cup. Panph.* 2. 2. 167. -- *Hort. Cath.* p. 83.

In montosis petrosis .

9. *Geranium lucidum* : pedunculis bifloris ; foliis quinquelobis rotundatis ; calycibus transversè corrugatis ; capsulis multicarinatis .

Geranium lucidum *Sp. pl.* 955. -- *Smith Brit.* 2. p. 733. -- *Sav. Due cent.* p. 119. -- *Cav. Ger.* t. 80. f. 2. -- *Desf. Atl.* 2. p. 104. -- *J. Bauh. Hist.* 3. p. 481.

Geranium rotundifolium saxatile montanum *Col. Ecphr.* 1. 1. 137.

Geranium annuum rotundifolium montanum , saxatile , lucidum *Cup. Hort. Cath.* p. 83.

Reperi prope Carenim nel Bosco della Cirsia.

40. *Geranium romanum* : scapis radicalibus erectis multifloris ; petalis integris aequalibus ; foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis .

Geranium romanum *Sp.pl.* 951. -- *Desf. Atl.* 2. p. 105. -- *Cav. Ger.* 2. 94 f. 2.

Geranium myrrhinum tenuifolium, am-
plo flore purpureo . *Barrel. Ic.* 1245.

In pascuis apricis frequens .

41. *Hesperis verna* : caule erecto ramoso ; foliis serratis hirsutis : radicalibus obovatis , caulinis sessilibus amplexicaulibus .

Hesperis verna *Sp.pl.* 928. -- *Desf. Atl.* 2. p. 90.

Draba alpina siliquosa minor purpurea ,
folio subrotundo aspero serrato *Cup. Panph.* 2. t. 243. et *Hort. Cath.* p. 66.

Hesperis alpina aspera oblongo-subrotundo
folio flore purpureo *Bonan.* t. 64.

Habitat in montibus *S. Martini* .

42. *Hyoseris scabra* : scapis unifloris inerassatis
ventricosus ; foliis pinnatifidis dentatis .

43

Hyoseris scabra *Sp. pl.* 1138. -- *Desf. Atl.* 2.

p. 332.

Hieracium Tragoponi foliis *Bocc. Mus.* 2.
106.

Dens Leonis minor crispus flore parvo
inexpanso , crassis cauliculis *Cup. Hort. Cath.*
p. 66. *et Panph.* 1. 2. 147. -- *Bonan.* 794.

In arvis, et pascuis.

43. *Inula montana* : foliis lanceolatis hirsutis sub-
integerrimis ; caule unifloro ; calyce imbri-
cato.

Inula montana *Sp. pl.* 1241. -- *Savi Due Cent.* p. 179.

Aster montanus *All. Ped.* n. 706.

Aster montanus hirsutus *Lob. Ic.* 350. *et Ad-*
vers. p. 148. f. 2.

Aster angustifolius luteus *J. Bauh. Hist.* 2.
p. 1046.

Aster montanus angustifolius luteus *Cup.*
Suppl. alt. p. 11.

Herba pilis longis mollibus appressis hir-
suta. Calycis squamae exteriores per ordinem
breviores ac latiores , basi pallidae.

Reperi in montibus *S. Martini* :

44. *Inula odora* : foliis hirsutis denticulatis : radicalibus ovato-oblongis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus ; caule paucifloro .

Inula odora *Sp. pl.* 1236. -- *Savi Due Cent.*
p. 179.

Aster odoratus *All. Ped. n.* 713.

Asteris altera species apula an Baccharis
Col. Ecp. h. i. p. 251. t. 253.

Baccharis minor Italica flore Asteris luteo *Barr. Ic.* 1145.

Aster luteus radice odora *Cup. Hort. Cath.*
p. 26.

Reperi in montibus *S. Martini* :

45. *Iris alata* : (a) acaulis ; corollis imberbibus, petalis interioribus minimis patentissimis ; foliis carinatis ; tubo longissimo .

Iris alata *Poiret It. 2. p.* 86. -- *Lam. Dict. 3.*
p. 302.

Iris scorpioides *Desf. Atl. 1. p.* 40. f. 6.

Iris humilis oporina Narcissi Jacobaei fo-

lio coerulea odora Asphodeli radice. *Cup.Hort.*
Cath.p.103.& Suppl.alt.p.42.

Iris autumnalis humilis purpurea Aspho-
 deli radice *Cup.Panph.2.t.230.* -- *Bonan.t.18.*

Habitat in pascuis sterilibus et ad rupes.

(a) Iris verna *Syn.H.R.P.*

46. *Lamarckia aurea.*

Lamarckia aurea. Moench.Meth.201.--Lam.
et Dec. Fl.Fr.3.p.30.

Cynosurus aureus Sp.pl.107.--Desf.Atl.1.
p.83.--Bert.Pl.Gen.p.16.

Chrysurus cynosuroides Pers.Syn.Pl.p.30.

Gramen paniculâ pendulâ aureâ *Scheuchz.*
Agrost.p.139.t.13.f.12. A.

Gramen sciurum seu alopecurum minus
 heteromallâ paniculâ *Barr.Ic.4.*

Gramen polyglumum denticulatum *Cup.*
Panph.2.t.74.--Bonan.t.6.

Gramen paniculâ pendulâ aureâ vel can-
 didâ glumis longis denticulatis *Cup. Hort.Cath.*
p.89.et Suppl.alt.p.33.

Ad muros et rupes

47. *Leuzea conifera*.

Leuzea conifera Lam. et Decand. *Fl. Franc.* 4.

p. 109.

Centaurea conifera Sp. pl. 1294. -- Desf.

Atl. 2. p. 295.

Jacea montana capite magno Strobili J.

Bauh. Hist. 3. p. 30.

Jacea montana, incana, capite Pyni Cup.

Hort. Cath. p. 101.

Stoebe pynea amplo capite Barr. *Ic.* 138.

Chamaeleon non aculeatus Lob. *Ic.* 2. p. 7. et

Advers. p. 367.

In montibus S. Martini.

48. Lichen *decipiens*: crustaceus: squamulis distinctis supernè rubentibus albo-marginatis, junioribus concavis; scutellis atris marginalibus.

Lichen *decipiens* Hedw. *St. Crypt.* 2. p. 7. t. 1.

f. B.

Psora decipiens Lam. & Dec. *Fl. Franc.* 2. p.

369.

Lichen *velvoldes* Jacq. *Coll.* 3. p. 108. n. 3. f. 3.

47

Lichen *dispermus* Vill. *Dauph.* 3. p. 994. t. 55.

Frequens circa Panormum supra terram.

49. Lichen *fulgens* : crustaceus : fronde pulverulenta citrinâ margine inciso-crenatâ ; scutellis badiis.

Placodium *fulgens* Lam. et Dec. *Fl. Franc.* 2. p. 378.

Lichen *citrinus* Hedv. *Crypt.* 2. p. 60. t. 20. f. C.

Lichen *friabilis* Vill. *Dauph.* 3. p. 979. t. 55.

Habitat in montibus S. Martini supra terram.

Amicissimus meus PATER JOACHIM RUSSO CASSINENSIS. Botanices Siculae assiduus cultor communicavit.

50. Lichen *crassus* : crustaceo-foliaceus : squamis imbricatis, obtusè lobatis, undulatis, supernè pallidè viridantibus margine albo ; scutellis rufis.

Squamaria *crassa* Lam. et Dec. *Fl. Franc.* 2. p. 375.

Lichen laqueatus Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. p.

109. t. 5. f. 2.

Lichen coespitosus Will. Dauph. 3. p. 976. t. 55.

Lichen cartilagineus Lam. Dict. 3. p. 480.

*Lichenoides cartilagineum scutellis fulvis
planis Dill. Musc. p. 179. t. 24. f. 74.*

Circa Panormum supra terram.

51. *Lichen acetabulum* : foliaceus repens lobatus
viridis ; scutellis testaceo-ferrugineis concavis
extus rugosis folio concoloribus.

Lichen acetabulum Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. p.

115. t. 9. f. 1.

Imbricaria acetabulum Lam. et Dec. Fl. Fr.

2. p. 392.

*Lichen corrugatus Smith Trans. of the Lin.
soc. vol. 1. n. 8.*

*Lichenoides acetabulis cutaneis et rugosis
Dill. Musc. 185. t. 24. f. 79.*

Lichen pulmonarius, infernè obscurus,
desuper e glauco subvirescens, receptaculis flo-
rum amplioribus ac densioribus atro-fuscis Mich.
Gen. 90. Ord. 20. n. 4. t. 48. f. 2.

Lichen pulmonarius arboreus e cinereo
viridis *Vaill. Bot. t. 21. f. 13.*

In montibus *S. Martini* ad quercuum cortices.

Misit P. Russo

52. Lichen *scrobiculatus*: foliaceus repens lobatus lobis rotundatis, supernè scrobiculatus verrucosus, infernè villosus, scutellis sparsis rubeis.

Lichen *scrobiculatus* *Scop. Carn. 2. n. 1391.*

Lichen verrucosus *Vulf. ap. Jacq. Coll. 4. p. 278. t. 18. f. 2.*

Lobaria scrobiculata *Lam. et Dec. Fl. Fran. 2. p. 402.*

Lichen pulmonarius arboribus adnascens infernè obscurus, desuper lacunosus ex glauco et cinero flavescens, reptaculis florum rubeis *Mich. Gen. 90. Ord. 21. t. 49.*

Lichenoides pulmoneum villosum, superficie scrobiculatâ et peltatâ *Dill. Musc. 216. t. 29. f. 114.*

Prope Carenim nel bosco della Cirasia ad arbores quercuum.

Lichen pseudo-pulmonarius: foliaceus repens lobatus, lobis sinuatis, supra reticulato-lacunosus, subtus villosus; scutellis sparsis marginatis.

Lobaria pulmonaria β Lam. et Dec. Fl. Fr. 2.p.402.

Muscus arboreus pulmonarius supra virens, subtus canus polyschides? Cup. Hort. Cath. Suppl. p.249.

Foliaceo-coriaceus, repens, latè expansus, in laciniis sinuatas partitus, superficie superiore reticulatâ, lacunosâ, viridi, glabrâ, inferiore, dentis tumoribus, lanuginosâ, villis rufis, centrum versus nigrescentibus. Scutellae numerosae, sessiles, sparsae, marginatae, margine crenulato, supra fuscae, subtus et margine rufae.

Prope Carenim nel bosco della Cirasta ad cortices quercuum.

54. *Linaria pilosa*: pilosissima; foliis alternis reniformibus crenato-lobatis; caulibus procumbentibus.

51

Linaria pilosa Lam. et Decand. Fl. franc. 3. p.

584.

Antirrhinum pilosum Mant. 249.

Linaria saxatilis, hirsuta, *Hederulae* folio, *clematites*, sive *Cymbalaria hirsuta saxatilis* Cup. Hort. Cath. p. 114.

Cymbalaria vel *linaria*, *clematites*, *saxatilis*, rotundo *Hederae* folio, hirsuta, purpurea Cup. Panph. 1. t. 214.

Linaria clematites, *saxatilis*, rotundo *Hederae* folio, hirsuta, purpurea, *cymbalaria* dicta Bonan. t. 24.

In montibus S. Martini.

55. *Linaria reflexa*: foliis ovatis glabris: inferioribus subternis, superioribus alternis; pedunculis fructiferis elongatis reflexis.

Linaria reflexa Desf. Atl. 2. p. 42. -- Lam. et Decand. Fl. Franc. 3. p. 585.

Antirrhinum reflexum Sp. pl. 857. -- Poir. et It. 2. p. 191. var. fl. albo.

Linaria myrsinites flore candido sulphureo

ristu croceo *Cup. Panph. 2. t. 15. et Hort. Cath. p. 114.*

In campis frequens.

66. *Linaria arvensis* : caule erecto ; foliis linearibus : inferioribus quaternis ; calycibus piloso-viscidis ; bracteis deflexis .

Linaria arvensis var. A Desf. Atl. 2. p. 45. -- p. 588.

Linaria simplex Lam. et Decand. Fl. Franc. 3.

Antirrhinum simplex Willd. Sp. 3. p. 243.

Antirrhinum arvense, var. γ Sp. pl. 855.

Linaria tetraphylla lutea Col. Ephr. 1. p. 299. t. 300.

Linaria oreades lutea parva brevi calcari, Lini folio glauco Cup. Panph. 2. t. 159.

Linaria quadrif. lutea Cup. Hort. Cath. p. 114.

Habitat in arvis.

57. *Linaria purpurea* : caule erecto , foliis linearilanceolatis , corollis purpureis .

Antirrhinum purpureum Mant. 416.

Linaria alpina , flore parvo , purpureo , Tithymali cyparissi foliis Cup. Panph. 2. t. 79. et Hort. Cath. p. 113.

Habitat in montibus.

58. *Lobelia tenella* : scapis unifloris bracteatis ;
foliis radicalibus ovatis subintegerrimis.

Lobelia laurentia var. β *Sp.pl.* 1321.

Lobelia minuta *Lam.es Dec.Fl.Fr.* 3.p.716.

Rapunculus aquaticus minimus &c. *Bocc.*

Mus.p. 35.1.27. *fig.minor.*

Rapunculus minimus *Bellidis minimae* folio tenui , flore coeruleo tricuspidato albâ maculâ insignito *Cup.Hort.Cath.p.* 189.

T. 2. Parva atque tenera planta. Radix perennis , fibrosa , repens. Folia omnia radicalia , in rosulas disposita , petiolata , elliptica vel ovata , glabra , laevissime emarginata , margine subdentato-repanda , nonnunquam integerrima . Scapi radicales , debiles , simplices , uniflori , medium versus bibracteati , bracteolis linearibus , brevibus , alternis vel oppositis . Calix quinquefidus , tubo corollae brevior . Corolla bilabiata dilutè violacea , intus pilosa albâque maculâ notata , ore luteo . Labium superius bifidum laciniis lineari-lanceolatis , inferius trifidum laciniis ovatis ob-

tusis cum appendicula. Antherae fuscae in tubum coalitae. Stigma pubescens. Capsula infera, bilocularis, loculis polyspermis.

Habitat ad margines fluminis *Oreti*.

Nimis affinis sed satis distincta a *Lobelia minuta* Lin., quae scapis nudis aliquando bifloris gaudet. Nunquam vero confundi potest cum *Lobelia laurentia*. Hujus enim praecipue caulis ramosus.

59. *Lotus biflorus*: leguminibus subconjugatis tetrapteris villosis; bracteis ovatis calyce brevioribus.

Lotus biflorus Desrousseaux. Dict. 3. p. 604.
-- *Desf. Atl. 2. p. 202. t. 210.*

Lotus conjugatus Poir. It. 2. p. 202. nec Lin.

Habitat in campis. Panormi sopra *S. Maria di Gesu*.

- 60 *Lotus tetragonolobus*: leguminibus solitariis tetrapteris glabris; bracteis ovatis; floribus purpureis.

Lotus tetragonolobus Sp. pl. 1089. -- *Desf. Atl. 2. p. 201.* -- *Gaert. 2. p. 337.*

Lotus oligoceros, *tetragonolobus*, annuus,
cretica, flore saturate rubro, seu holosericeo
coccineo *Cup. Hort. Cath.* p. 116.

Habitat in pascuis montosis. Panormi sopra *Monte Peregrino*.

61. *Lotus siliquosus* : leguminibus solitariis tetra-
pteris glabris, bracteis lanceolatis.

Lotus siliquosus. var. β *Desrous. Dict.* 3. p.
603. -- *Savi Due Cent.* p. 134.

Lotus maritimus *Sp. pl.* 1089.

Lotus an *maritima* lutea siliquosa folio
pingui etc. *Cup. Suppl. alt.* p. 57.

In arenosis maritimis.

62. *Lupinus prolifer* : calycibus alternis appendi-
culatis : labio superiore integro, inferiore tri-
dentato.

Lupinus prolifer *Desrous. Dict.* 3. p. 662.

Lupinus sylvestris latifolius flore albo;
sativum in omnibus aemulans, edulis *Cup. Hort.*
Cath. p. 117.

Reperi prope *Capacim* in campis.

63. *Moheringia muscosa*.

Moheringia muscosa. *Sp.pl.* 515. -- *Savi Pis.*
1. p. 292. -- *Lam. Illustr.* t. 314. -- *Gaert.* 2. p. 226. t.
129. f. 11.

Alsine tenuifolia muscosa *Cup. Panph.* 3. t.
35. et 2. t. 143.

Alsine omnium minima angustissimo fo-
lio, muscoso flore *Cup. Hort. Cath.* p. 6. et *Suppl.*
alt. p. 6.

In umbratis humidis .

64. *Narcissus serotinus*: (a) spatâ multiflorâ ; nec-
tario brevissimo integro crenulato ; petalis lan-
ceolatis ; foliis linearibus canaliculatis .

Narcissus spatâ multiflorâ, nectario bre-
vissimo sexpartito. *Sp.pl.* 417. -- *Desf. Atl.* 1. p. 283.
t. 82.

Narcissus autumnalis vulgaris, albus, stel-
laris, medio croceus odoratissimus tenuifolius
Cup. Hort. Cath. p. 149.

Narcissus autumnalis, vulgaris, stellaris,
albus, medio croceus, odoratissimus, mono-
juncifolius *Cup. Panph.* 2. t. 250. -- *Bonan.* t. 38.

57

Narcissus medio croceus tenuifolius *Lob.*

*Adv.p.*490.

In campis solo calcareo.

Nectarium saepè crenulatum, aliquando
integerrimum, nunquam vidi sexpartitum.

(a) Narcissus novus *Syn.H.R.P.*

65. *Neotia spiralis.*

Neotia spiralis Lam.et Dec.Fl. Franc. 3.

*p.*257.

Ophris spiralis Sp.pl. 1340. -- Savi Pis.2.p.
302.-- Curtis Lond.Ic.--Smith.Brit.3.p.934.

Epipactis spiralis All.Ped.n.1852.

Orchistraum aestivum palustre album odo-
ratum Mich.Gen.p.30.t.26.

Orchis spiralis alba odorata Cup.Hort.Cath.
p.158.

Habitat in montibus *S.Martini.*

66. *Orchis longibracteata*: bulbis indivisis; petalis
conniventibus; nectarii labio trifido: laciniâ
mediâ exporrectâ bilobâ; bracteis flore longio-
ribus.

Orchis myodes liliacea hircina flore rubro porphyrographi fimbriata Bon. t. 33.

Monorchis myodes liliacea hircina, flore magno rubro porphyrographi Cup. Panph. 1. t. 200.

Orchis myodes hyemalis liliacea, hircina, fimbriato flore, magno, rubro, porphyrographi. Cup. Hort. Cath. p. 157. et Suppl. alt. p. 67.

T. 3. Bulbi duo subrotundi. Scapus teres, subflexuosus, vaginatus foliis ovatis vel oblongo-lanceolatis, striatis, pagina superiore præcipuè lucidis. Flores magni graveolentes in spicâ pyramidali, compactâ. Petala in galeam conniventia, extus purpurea nervis viridibus, intus albo-viridia punctis rubris pulchrè notata. Opercula petalis angustiora, herbida. Nectarium labium maculis albis purpureisque variegatum, trifidum; segmento medio productiori, bilobo cum appendiculâ internâ, laterali, brevissimâ, aliquoties nullâ; segmentis lateralibus margine externo undulatis. Nectarium cornu germine trigono, intorto brevius. Columna antherifera brevis, apice obtusa. Stigma obcordatum. Bra-

cteae virides; lanceolatae; cucullum sive ⁵⁹
leam superantes.

Fl. Febr.

In campestribus succulentis. Panormi die-
tro S. Francesco di Paola fra li ficu d'Innia di
Cannatedda.

67. *Orchis papilionacea*: bulbis indivisis; nectarii
labio indiviso ampliato emarginato crenato;
cornu subulato; petalis conniventibus.

Orchis papilionacea Sp. pl. 1331. -- *Berol.*
Pl. Gen. p. 118. -- *Desf. Atl. 2. p. 316.*

Orchis speciosa expanso cochleari flore
purpureo elegantissimè picturato fimbriato *Bo-*
nan. 1. 31. -- *Cup. Horti Cath. p. 158.*

In pratis et pascuis.

68. *Ophris disthoma*: bulbis subrotundis; scapo
folioso; nectarii labio tripartito: lobis latera-
libus verticalibus, medio convexo emarginato;
appendiculâ dorso insertâ.

Bulbi duo subrotundi, altero remoto.
Scapus teres, erectus, 2-6uncialis, infernè va-
ginatus. Folia lanceolata, striata. Flores ino-
dori in spica laxa, 1-5flora. Petala in trian-

gulum patentia, ovata, concava; viridia. Opercula pariter patentia, viridia, enervia, margine revoluta, petalis angustiora, breviora. Columna minuta, apice obtuso, rufula, dissepimento viridi. Nectarii labium tripartitum, holosericeum, fuscum; lobo medio latiori, convexo, emarginato, dorso pone apicem appendiculato, appendiculâ sursum versâ, hiantem; lobis lateralibus refractis, verticalibus, triangularibus. Germen polygonum, subcompressum.

In pascuis montosis siccis. Prope Panormum sopra S. Maria di Gesu.

69. *Ophris ciliata*: bulbis subrotundis scapo folioso; nectarii labio trilobo limbo barbato; lobis lateralibus sublatis, medio productiori emarginato mutico; operculis angustissimis recurvatis.

Orchis Ricinum villosum referens *Cup.*

Panph. 1. t. 175. *Hort. Cath.* p. 158. et *Suppl. alt.* p. 68. -- *Bonan.* t. 28.

Nil pulchrius. Radix bulbi duo subrotundi. Caulis 3-6uncialis, foliis lanceolatis vagi-

natus, pauciflorus. Flores in spicâ laxâ muscas circumvolantes mirè referunt. Petalum superius fornicatum, columnam tegens, marginibus revolutis; duo lateralia patentia, ovata, viridia, fasciâ roseâ per medium. Opercula petalis duplo breviora, angustissima, acuminata, intensè purpurea, recurvata. Nectarium labium trilobum, coeruleum, splendens, limbo barbato barbâ purpureâ; lobo medio exprorecto, obovato, convexo, emarginato, mutico; lateralibus angustioribus, suspensis alarum instar. Columna obtusa.

In pascuis montosis. Panormi *sopra S. Maria di Gesu*.

70. *Ophris speculum*: bulbis subrotundis; scapo folioso; nectarium labio convexo elongato incurvato; columnâ acutâ porrectâ fornicatâ.

Ophris (speculum) bulbis subrotundis scapo folioso; labio convexo elongato simplici, sursum curvo; anticè maculâ solitariâ *Bertol. Pl. Gen. p. 124.*

Orchis ornifuciflora, fuliginea, cluniculâ depilatâ fuscâ *Cup. Hort. Cath. p. 158. et*

Suppl. alt. p. 68. Panph. 1. t. 175. -- Bonan. 2. 28.

T. 4. Radix bulbi duo subrotundi. Caulis erectus, internè vaginatus foliis lanceolatis, striatis. Spica laxa, pauciflora. Petala lanceolata, in triangulum patentia, rosea dorso viridi. Opercula petalis angustiora, breviora. Nectarii labium holosericeum, fusco-purpureum, integrum vel trilobum, elongatum, convexum, laeniter incurvum, emarginatum cum appendiculâ sursum flexâ, disco anticè areolâ sive maculâ atro-sanguineâ, glaberrimâ, lucidâ (*speculo*) notatum. Columna porrecta, fornicata, aviculaeformis rostro acuto.

In pratis et pascuis. Panormi *dietro S. Francesco di Paola*.

71. *Ophris apifera*: bulbis subrotundis; scapo folioso; nectarii labio convexo quinquefido: laciniâ terminali recurvatâ; appendiculâ subulatâ sursum flexâ.

Ophris apifera Smith Brit. 3. p. 938. -- Curtis Lond. Ic. -- Bertol. Pl. Gen. p. 122.

Testiculus vulpinus secundus sphegodes
Lob. Ic. 179.

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascentibus *Vaill. Paris. 146.t.30.f.9. -- Cup.Hort.Cath.p.157.*

In montibus *S. Martini.*

72. *Panicum repens*: (a) paniculâ virgatâ; foliis inferioribus divaricatis; culmo basi repente.

Panicum repens Sp.pl. 87. -- Desf. Atl. 1. p. 60. -- Cav. Ic. n. 119. t. 110.

Gramen palustre jubâ et raro semine sorghi, foliis angustè intra se collectis *Cup.Hort. Cath.p.90.et. Suppl.alt.p.33.*

Ad ripas fluminum et rivulorum lentè fluentium.

Calycibus bifloris flosculo altero hermaphrodito, altero masculo passim occurrit.

(a) *Panicum coloratum Syn.H.R.P.*

73. *Panicum glaucum* (a): spicâ tereti; involuclis bifloris multisetosis; seminibus undulato-rugosis.

Panicum glaucum Sp.pl. 83. -- Savi Pis. 1.

p.65.--*Leers Herb.* 12. t.2.f.2. -- *Schreb. Gram.* 2.p.
21. t.25.--*Gaert.* 1.p.2.t.1.

Gramen paniceum simplici spicâ longiori
alopecuroide canâ fulvidâ *Cup. Panph.* 2. t.22.
& *Suppl.alt.* p.33.

In glareosis inundatis.

(a) *Panicum helvolum* *Syn.H.R.P.*

74. *Panicum Crusgalli* (a): spicâ decompositâ; spiculis alternis conjugatisque subdivisis; calycibus aristatis hispidis; rachi subquingulari.

Panicum Crusgalli *Sp. pl.* 23. -- *Savi Pis.*
1.p.65. -- *Bert.Pl. Gen.* p.8. -- *Curtis London Ic.*
-- *Leers Herb.* 13. t.2.f.3.

Panicum oryzoides *Ard.Spec.* 2. t.5.

Gramen paniceum seu panicum sylvestre
palustre spicis e viridi atro-rubentibus *Cupani*
Bonan. 1.93.

Panicum vulgare spicâ multiplici longis
aristis circumvallatâ *Tourn.Bonan.* 1.8.

Gramen paniceum palustre spicis multis;

angustis, successivis, rubro-nigricantibus *Cup.*
Hort.Cath.p.88.

Gramen paniceum, tenellum, spicis cristatis, angustis, successivis, obscurè virentibus. *Cup.Suppl.alt.p.31.*

In arvis humidis et ad ripas fossarum.

(27) Gramen verè polymorphum. Preter varietates ab auctoribus memoratas, alia etiam varietas apud nos frequens reperitur caulibus decumbentibus, foliis rubro maculatis, rachi trigonâ, calycibus mucronatis, hispidis, quae Panicum colonum *Syn.H.R.P.*

75. *Passerina hirsuta*: foliis carnosis extus glabris; caulibus tomentosis.

Passerina hirsuta Sp.pl.513. -- Desf. Atl.1. p.330.

Thymelea tomentosa foliis sedi minoris
Cup.Hort.Cath.p.212. et Suppl.alt.p.86.

Sesamoides parvum Dalechampii *J.B.Hist. p.595.*

Erica alexandrina Italorum etc. *Lob. Ic.*

2.p.217./1.

In arenosis maritimis .

Flores hermaphroditos aut dioicos vidi .

76. *Poa bulbosa* : paniculâ ovatâ laxiusculâ ; spiculis subquadrifloris ; glumis villo connexis ; culmo basi bulboso .

Poa bulbosa var. β *Sp.pl.* 102.--*Bert.Pl. Gen.* p.13.cum bona descriptione -- *Savi Pis.* 1. p.104.

Gramen murale junceum minus, Allii radice, paniculâ janthinâ non crispâ *Barr.Ic.* 713. f. 1.

Gramen arvense paniculâ crispâ pallidâ seu majus *Barr.ib.f.* 3.

Gramen arvense paniculâ crispâ *C.B.Prod.* p. 6.

Gramen arvense angustifolium, paniculâ densâ, foliaceâ, foliolis in paniculâ angustissimis *Scheuchz.Agrost.* 211. t.4.f.13. A B C.

Gramen paniculâ crispâ, proliferâ nutabundâ *Bonan.* t.6.

Gramen saxatile crispum xerampelinum
Cap. Panph. 2. t. 74. f. A A.

Gramen arvense paniculâ crispâ *Cup. Hort.*
Cath. p. 17.

„Panicula plantae superius descriptae adeo tota degenerat, ut flosculi transeant in bulbos. Hic tamen transitus fit per varios gradus, ut saepe locustae vix immutatae partim adhuc floriferae, partim bulbiferae conspiciantur, saepe vero omnino bulbiferae et crispae evadant; hinc diversae Barrelierii icones, quae omnes bonae pro vario metamorphoseos gradu: nec species distincta haec varietas censi potest, ut innuit Smithius in Flora Britannica, „*Bertol. loc. cit. p. 15.*

In prâtis et pascuis.

77. *Poa fluitans*: paniculâ ramosâ divaricatâ; spiculis adpressis teretibus multifloris; flosculis obtusis septemnerviis basi duplicato-nervosis.

Poa fluitans *Smith Brit. 1. p. 95. -- Bert. Pl. Gen. p. 12. -- Lam. et Dec. Fl. Franc. 3. p. 57.*

Festuca fluitans *Sp. pl. 111. -- Savi Pis. 1. p.*

119. -- Desf. *Atl.* 1. p. 87. -- Leers *Herb.* 1. 8. f. 5. --
Curtis Lond. Ic. -- Schreb. *Gram.* 37. t. 3. -- Lam.
Dict. 2. p. 462.

Gramen polydactyloides candidum palu-
 stre Bonan. t. 5.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spi-
 câ Scheuch. *Agrost.* 199. t. 4. f. 5.

In fossis.

78. *Ranunculus bullatus* : foliis ovatis serratis ;
 scapo nudo unifloro .

Ranunculus bullatus Sp. pl. 774. -- Desf.
Atl. 1. p. 435.

Ranunculus lusitanicus Dod. *Pempt.* 429.

Ranunculus autumnalis alter latifolius mi-
 nus bullatus Cup. *Fanph.* 1. t. 196.

Prope Panormum alla Grazia . Floret au-
 tumno .

79. *Ranunculus flabellatus* : caule erecto subuni-
 floro ; foliis radicalibus aliis integris , aliis
 tripartitis incis, caulinis paucis ; radice bul-
 bosâ .

Ranunculus caule simplici hirsuto ; foliis

radicalibus flabelliformibus, inciso-lobatis, caulinis paucis multipartitis; caule subunifloro.

Desf. Atl. 1. p. 438. t. 114.

Prope Panormum *sopra S. Maria di Gesu.*

80. *Rumex bucephalophorus*: floribus hermaphroditis; valvulis dentatis nudis; pedicellis planis reflexis incrassatis.

Rumex bucephalophorus Sp. pl. 479: -- Cav.

It. 31. t. 41. f. 1. -- Desf. Atl. 1. p. 319.

Acetosa Ocymi folio Neapolitana Coli Ecphr.

1. p. 151. t. 150. -- Cup. Hort. Cath. p. 3.

Panormi nel Piano della Consolazione.

81. *Saponaria illyrica*: pubescens: calycibus quinqueangularibus; foliis linearibus trinerviis; petalis fauce tripunctatis.

Saponaria illyrica Mant. 70. -- Ar. l. Spec. 2. p.

24. 7. 9.

Caryophyllus saxatilis gramineo folio Centaurii minoris flore umbellatus Cup. Panph. 1. 2. 226.

Lychnis gramineis foliis flosculis integris candidis subtus purpurantibus Cup. Suppl. alt. p. 58.

Formosa planta , pubescens et visciduloscula . Radix lignosa , fusiformis . Caules plurimi , 4-1 unciales , graciles , foliosi , subcompressi , purpurascens , diffusi , decumbentes , supernè paniculati . Folia linearia , angustissima , acuta , ciliata , superficie superiore plana , inferiore trinervia , basi connata . Panicula floribus parvis multiflora . Calyx pyramidalis angulis purpurascens , quinquedentatus dentibus acutis , margine albo , membranaceo . Petala unguiculata , supernè alba vel pallidè lutea , ore tripunctato punctis purpureis , quincuncem referentibus , infernè purpurascens vel purpureo lineata , integerrima , obovata . Antherae violaceae . Capsula omnino unilocularis , quadrivalvis . Semina nigra , oblonga , compressa , pedicellata .

Circa Panormum ad muros et ad margines agrorum , etiam in pascuis montosis sterilibus . Reperta cum C.S. RAFINESQUE SCHMALTZ

Fl. per totam aetatem .

82. *Saxifraga tridactylites* : foliis cuneiformibus al-

ternis trifidis quinquefidisve : summis indi-
visis ; caule paniculato ; germine infero. 71

Saxifraga tridactylites *Sp. pl.* 758. -- *Curt.*
Lond. lc. -- *Smith Brit.* 2. p. 454. -- *Savi Pis.* 1. p. 457.

Paronichia altera *Dod. Pempt.* 112.

Paronichia altera rutaceo folio *Lob. Ic.*
469.

Prope coenobium *S. Martini*.

83. *Saxifraga bulbifera* : foliis inferioribus petiola-
tis reniformibus crenatis lobatisve , superio-
ribus sessilibus ; caule paniculato bulbifero ;
germine semiinfero.

Saxifraga bulbifera *Sp. pl.* 577. -- *Lam. et De-*
can. Fl. Fr. 4. p. 369.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera mon-
tana *Col. Ecphr.* 2. p. 318. t. 317.

Prope Panormum sopra Monte Cuccio .

84. *Schoenus mucronatus* : culmo tereti nudo ; spi-
culis ovatis fasciculatis ; involucro subhexa-
phylo patente ; foliis canaliculatis .

Schoenus mucronatus *Sp. pl.* 63. -- *Desf. Atl.*
1. p. 41. -- *Bertol. Pl. Gen.* 6. -- *Savi Pis.* 1. p. 38.

Scirpus maritimus capite glomerato *Scheuchz. Agrost. p. 367. t. 8. f. 1.*

Juncus maritimus *Lob. Ic. 87.*

Cyperus marinus compactâ eleganti paniculâ obsolete coccineâ *Cup. Panph. 1. t. 104.*

Cyperus radice longâ odorâ angustifolius in umbellâ trifolius *Bonan. t. 12.*

In arenosis maritimis. Prope Panormum alla tonnara di Capaci.

25. *Scirpus setaceus* : culmo nudo setaceo ; spicis lateralibus subgeminis sessilibus.

Scirpus setaceus *Sp. pl. 73. -- Smith Brit. 1. p. 54. -- Leers Herb. 10. t. 1. f. 6. -- Desf. Atl. 1. p. 49. -- Gaertn. 1. p. 10. t. 2. f. 3.*

Scirpus filiformis *Savi Pis. 1. p. 46.*

Scirpus omnium minimus capitulo brevi *Scheuchz. Agrost. p. 358.*

Juncellus minimus capillaris paniculis nigris singularibus *Cup. Panph. 2. t. 52.*

Junculus paniculâ duplici nigrâ *Cup. Hort. Cath. p. 104.*

In glareosis et arenosis inundatis.

86. *Senecio vernus*: radio patente ; corymbo paucifloro ; foliis inferioribus petiolatis obovatis, superioribus pinnatifidis amplexicaulibus .

Senecio humilis vernalis subrotundo Senecionis folio Bocc. Mus. p. 169. t. 100. f. mala .

Senecio leucanthemifolius Poiret It. 2. p.

238.?

T. 5. Radix attenuata , parva, fibris albis obiecta , in humidiusculis prorsus fibrosa . Caules 3-7 pollicares , herbacei , angulato-teretes , foliosi , ramosi , directione varii , modo enim basi decumbentes atque radicanes , modo suberecti . Folia radicalia et caulina inferiora petiolata , obovata ; superiora per gradus pinnatifida , sessilia , amplexicaulia ; omnia glabra inaequaliter dentata . Corymbi terminales , pauciflori , pedunculis laxè lanatis , squamosis . Flores lutei radiati . Calyx cylindraceus , glaber , simplici serie polyphyllus foliolis linearibus , aequalibus , acutis , apice sphacelatis , basi calyculatus squamis numerosis , adpressis , acuminato-subulatis , apice etiam sphacelatis . Li-

gulae radii patentes, ellipticae, tandem revolutae. Semina angulata, pilosa pilis albis adpressis. Pappus oculo armato scabriusculus. Receptaculum areolatum, mammillatum, areolarum margine in membranulam tenuem, deciduam producto.

In campis et pascuis. Reperi etiam ubi *Bocconius*.

87. *Serapias cordigera*: bulbis subrotundis; nectararii labio trilobo maximo basi canaliculato; lobo intermedio subcordato.

Serapias cordigera *Sp.pl.* 1345. -- *Poiret It.* 2. p. 250. -- *Desf. Atl.* 2. p. 321. *fl. Atl.* 2. p. 321.

Serapias bulbis subrotundis; petalis cucullatis; labio trilobo, basi canaliculato. *Bertol. pl. Gen.* p. 125. *fl. Atl.* 2. p. 321.

Serapias lingua *α Savi Pis.* 2. p. 304.

Orchis ferruginea linguaeformis cordato maximo flore *Cup. Hort. Cath.* p. 157. -- *Bonan.* 7. 31.

In petrosis montosis.

88. *Serapias lingua*: bulbis subrotundis; nectararii

labio trilobo petalis longiore , lobo intermedio lanceolato . ⁷⁵

Serapias lingua *Sp.pl.*134. -- *Poiret It.*2.p. 250.--*Savi Pis.*2.p.304.-- *Desf.Atl.*2.p.322.

Serapias bulbis subrotundis ; petalis cucullatis ; labio trilobo basi in callum extuberante *Bertol.Pl.Gen.*p.125.

Orchis lingua *All.Ped.*1833.

Orchis macrophylla *Col.Ephr.*2. p.321. 2. 322.

Orchis montana italica flore ferrugineo ; lingua oblonga *Cup.Hort.Cath.* p.157.

Cum praecedenti.

Nectarii labium basi callo plerumque laevi , interdum sulcato .

89. *Silene decumbens* : floribus subsolitariis terminalibus ; petalis bifidis obtusè coronatis ; foliis obovatis basi ciliatis ; caulibus decumbentibus.

Silene ciliata *L.Wild.*p.692.?

Lychnis marina minor supina , amplo flore rubro , folio oblongo rotundo , praecox *Cup.Hort.Cath.*p.119

Lychnis marina minor pubescens amplo
flore rubro sulcato *Cup. Panph. 2. 2. 151.*

Lychnis marina minor pubescens , amplo
flore rubro sulcato , folio oblongo rotundo , re-
pens *Bonant. 87.*

T. 6. Radix parva, subramosa. Caules 4-6 un-
ciales, simplices vel parum ramosi, diffusi, basi
decumbentes, foliosi, geniculati, pilosi, pilis
in internodiis inferioribus patentibus, longio-
ribus, in superioribus, velut in pedunculis
calycibusque, adpressis, brevioribus. Folia cras-
siuscula, integerrima, scabra, obovata, in pe-
tiolum decurrentia, basi pilis longis ciliata.
Flores terminales 1-4, pedunculati, rosei, ere-
cto-patuli. Calix clavatus, decemstriatus striis
purpureis, dentibus 5, obtusis, ciliatis. Petala
fauce coronata, coronâ coadunatâ, ultra me-
dium bifida, laciniis obovatis. Capsula ovata
apice sexdentata. Semina reniformia, margine
hinc inde undulato-crispo.

Fl. Primo vere.

In pascuis arenosis maritimis.

90. *Sinapis pubescens* : siliquis pubescentibus erectis ; rostro compresso ; foliis lyratis villosis .

Sinapis pubescens *Mantis*.95. -- *Ard. Spec.*

1.p.21.2.9.

Raphanus arvensis *Raphani vulgaris* foliis , *Irionis* siliquis *Cup.Panph.*2.t.238.

Sinapi montanum luteum *Raphani vulgaris* foliis , *Irionis* siliquis *Bonan.*1.51.

Raphanistrum luteum , *hirsutum* , *Raphani vulgaris* foliis , siliquis *Irionis* more concinnatis *Cup.Hort.Cath.*p.187.et *Suppl.alt.* p.77.cum var.

In campis et ad ripas fossarum . *Panormi alla Guadagna* .

91. *Sinapis eruroides* : siliquis glabris patentibus ; foliis lyratis glabris ; caule scabro .

Sinapis eruroides *Sp.pl.*934.

Eruca sylvestris flore albo *Italica* *Barr.* 1.132.

Sinapi arvense album hyemale *Rapifolio* semine luteo *Cup.Hort.Cath.* p.201.

Sinapi hyemale arborum flore albo Rapi-
folio *Bonan.t.52.*

Panormi in arvis frequens.

92. *Thlaspi luteum* : siliculis obcordatis ; foliis den-
tatis ; inferioribus petiolatis , superioribus cor-
dato-ovatis amplexicaulibus .

Thlaspi montanum *Glasti* folio parvum ,
perfoliatum , nonnihil serratum , siliculâ cor-
datâ *Cup.Panph.2.7.256.*

Thlaspi montanum luteum *Glasti* folio ,
parvum , perfoliatum , nonnihil serratum , si-
liculâ cordiformi *Cup. Hort.Cath. p.212.*

Plantula glauca , glabra , 1-3uncialis . Ra-
dix fibrosa . Caulis erectus , simplex vel basi
ramosus . Folia radicalia et caulina inferiora
petiolata , spatulata , superiora cordato-ovata
amplexicaulia , omnia medium versus dentata
binis quatuorve dentibus . Flores singulari no-
ta lutei in corymbo terminali , demum in ra-
cemum elongato . Petala calyce longiora , emar-
ginata . Silicula obcordata lobis stylum includen-

tibus vel subaequantibus . Stigma capitatum .

Semina utrinque pauca .

Annua . Fl. Apr. Majo .

In montosis siccis . Panormi *sopra S. Maria di Gesu* .

93. *Tordilium humile* (a) : foliolis inferioribus ovatis inciso-crenatis ; caule infernè piloso ; involucri minimis setaceis .

Tordilium foliolis inferioribus pinnatis ; foliolis lobatis , incis ; caule infernè piloso ; involucri minimis setaceis ; seminibus margine crenatis . *Desf. Atl. 2. p. 235.*

Seseli Siculum , candidum , cretico minori affine , folio rotundiori , multo minori , gracilius . *Cup. Hort. Cath. p. 200. Panph. 2. t. 245.*

Prope Panormum *sul Monte Peregrino* .

(a) *Tordilium officinale* *Syn. H. R. P.*

94. *Triticum maritimum* : calycibus multifloris ; spiculis mucronatis divaricatis ; culmo et spicâ ramosâ .

Triticum maritimum *Sp. pl. 128. -- Vivia-*

ni Fragm.Fl.It.ap.an. Bot.vol.1. part.2. p.158. --

Cyrl.Fasc.2.p.9.t.2. --Savi Pis.1.p.151.

Gramen maritimum paniculâ loliaceâ *C.*

B.Prod.18.

Gramen loliaceâ paniculâ, ramosâ, maritimum *Scheuchz. Agrost.p.274.t.6.f.5.*

Gramen maritimum paniculis asperis loliaceis *Bocc.Mus.p.135.t.95.*

Gramen maritimum locustis hians rostelum: Aviculae imitantibus *Cup. Panph.2. t.185. Hort.Cath.p.92. -- Bonan.t.2.*

Reperiubi *Bocconius* .

95. *Tussilago fragans* (a) : thyrsos fastigiato; floribus radiatis; foliis subrotundo-cordatis aequaliter denticulatis, subtus pubescentibus.

Tussilago fragans Wild.Sp.pl. 1699.

In umbrosis humidis, praecipue arenosis.

(a) *Tussilago hybrida Syn. H.R.P.*

96. *Trifolium repens* : capitulis umbellaribus; leguminibus tetraspermis; caule solido repente; pedunculis longissimis.

Trifolium repens Sp.pl.1080.--Curtis Lond.
 Ic.--Riv.Tetrap.Irr.t.14.f.2.--Smith Brit.2.p.783.
 exclus.syn.Vaill.--Savi Pis.2.p.161.

Trifoliastrum Mich.Gen.t.25.f.1.3.4.

Trifolium pratense album foemina repens
 lato folio maculato Cup.Panph.1.t.100.

Trifolium pratense album Cup.Hort.Cath.
 p.216.

Trifolium pratense, palustre, saepè resupinum, majori folio subrotundo, albâ falcatâ maculâ signato Cup.Suppl.alt. p.90.

In pratis et pascuis praecipuè humidis.

97. *Trifolium hybridum*: capitulis umbellaribus; leguminibus tetraspermis margine exteriori emarginatis; caule solido adscendente.

Trifolium hybridum Sp.pl.1079.excl. syn.
 Mich.t.25.f.2. quod ad Michelianum. Fl.Pis.spec.
 dat et syn. Vaill.--Savi Pis.2.p.158.

Trifoliastrum annuum corymbiferum album et procumbens, folio cordato, subtus atrovirente, splendente; siliquâ infernè falca-

tim discriminatâ. *Mich.Gen.27. Ord.2.n.2.25.f.*

6. *bona.*

Trifolium pratense infirmum folio subrotundo, capitulo laxo candido, flore odorato Cup.

Panph.1.t.8.Hort.Cath.p.216.

Cum. praecedenti.

N. *Trifolium hybridum Fl. Atl. corollis dilutè roseis, leguminibus. dispermis alia species est: videtur, ni fallor, Trifolium elegans fl. Pis, cui certo non spectat syn. Mich.Gen.27.2.25.f.c.*

98. *Trifolium fragiferum: capitulis subrotundis; calycibus inflatis bidentatis reflexis; caulibus repentibus.*

Trifolium fragiferum Sp. pl. 1806. -- Savi Pis.2.p.164.-- Smith Brit.2.p.791.-- Curtis Lond. Ic.

Trifolium vesiculis in capitulum congestis asperis, maximum Cup. Panph.2.2.200.

Trifolium vesiculis in capitulum congestis asperis maximum supinum Bonan.t.97.

Trifolium fragiferum folio oblongo Vaill. Par. 1.22.f.2.

In pratis et pascuis.

99. *Vinca major*: floribus pedunculatis; foliis ovatis ciliatis; dentibus calycinis setaceis elongatis.

Vinca major *Sp. pl.* 304. -- *Savi Pis.* 1. p. 259. -- *Smith Brit.* 1. p. 270. -- *Desf. Atl.* 1. p. 206. -- *Curt. Lond. Ic.* -- *Lam. Illustr. t.* 172. f. 1.

Clematis Daphnoides maxima purpureo flore frontato *Cup. Panph.* 2. t. 88. *Hort. Cath.* p. 52.

In umbrosis praecipue humidis. Panormi sotto S. Spirito.

100. *Ziziphus lotus*: aculeis geminis altero recurvo; foliis ovatis crenatis; drupâ rotundâ.

Ziziphus lotus *Desf. Atl.* 1. p. 200. -- *Lam. Illustr. t.* 185. f. 2.

Rhamnus lotus *Sp. pl.* 281. -- *Poir. It.* 2. p. 126.


Jujuba sylvestris infoecunda *Cup. Hort. Cath.* p. 104.

Ziziphus sylvestris humilis infructuosa *Cup. Panph.* 2. t. 73.

Locis aridis . Panormi sopra Monte Peregrino.

Vix indigenus .






Tab. 1.



Dianthus rupicola

Pietro Vaincher incis. e Del.



Tab. 2.



Lobelia tenella

Vaincher inc.

Vaincher inc. e


Tab. 3.



Ophrys speculum

Vaincher inc. e Del

Tab. 4.




Vaincher inc. e Del

Tab. 4.

Orchis longibracteata.



Vaincher inc. e del



vernus

Vaincher in


Tab. 5



Vaincher inc. & Del

Senecio vernalis

Tab 6



Silene decumbens

L. W. me. Del.



SICULARUM PLANTARUM
CENTURIA SECUNDA.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

VIRO CELEBERRIMO
IOSEPHO XAVERIO POLI
DE HISTORIA NATVRALI BENEMERITO
PROPTER
INSIGNE OPVS SVPER CONCHYLIIS
IN PROVEHENDIS OMNIVM DISCIPLINARVM CVLTORIBVS
BENIGNISSIMO
IN GRATI ANIMI PVBLICVM TESTIMONIUM
SECVNDAM SICVLARVM PLANTARVM CENTVR^{TIAM}
D. D. D.
ANTONINVS BIVONA BERNARDI

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 40
PART 1
1910

IN THE MONTH OF JANUARY 1910

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

1910

BY THE EDITOR

1. *Adiantum fragrans*: fronde bipinnata, foliis ovatis, obtusis, inciso-crenatis.

Adiantum fragrans Murr. *Syst. Veg.* 940. —
Viviani Fragm. 11. ap. Ann. Bot. vol. 1. p. 2. pag. 190.

Polypodium fragrans L. *Mant.* 307. non
Spec. — Desf. Atl. 2. p. 408. t. 257.

Polypodium pteridioides Reich. *Syst.* 4.
p. 424.

Filicula foemina saxatilis, tenuiter dentata, ramosa, vix odora, odore Loti Cup.
Panph. 1. t. 148. et Hort. Cath. p. 79.

Paronichiae primae similis filicula, lotum odoratam olens Cup. *Panph. et Hort. Cath. ibidem.*

Reperi in Ætna prope la Lecaia.

2. *Aira canescens*: foliis setaceis, summo spathaceo; aristis apice clavatis, calyce brevioribus.

Aira canescens Sp. pl. 97. — Savi *Pis. 1. p. 88. — All. Ped. 2. p. 244.*

Gramen foliis junceis oblongis radice alba
Scheuchz. *Gram.* 242. t. 4. f. 29. 30.

Gramen foliolis junceis radice jubata
Scheuchz. *Gram.* 243. t. 4. f. 31.

Gramen exile durius Noruegicum aut
Danicum Scopario graminis cognatum Lob. *Al-*
vers. 466. Ic.

Folia caulina saepe plana; radicalia semper
setacea.

Reperi in arenosis maritimis prope Ca-
tanam.

3. *Allium magicum*: scapo nudo tereti; foliis lan-
ceolatis amplis, inferiore apice bulbifero; um-
bellâ fastigiatâ.

Allium magicum Sp. pl. 424.

Allium caule tereti propagine ex ala
Savvaz. *Monsp.* 18.

Allium (*speciosam*) umbellâ hemisphae-
ricâ aequali; staminibus simplicibus; foliis
oblongis concavis glaberrimis Cyr. Pl. rar
fasc. 2. t. 5. p. 49.

Moly album latifolium seu *Xiridis folio*
Cup. *Suppl. alt.* p. 62.?

Bulbus rotundus odore rapaceo, pollicaris vel sesquipollicaris diametri, intus albus, solidus, extus tectus tunicis e rubro fusciscentibus. Scapus nudus, glaberrimus, teres, solidus, erectus, 2-3 pedalis. Folia omnia radicalia, petiolis vaginantibus, scapo breviora, lanceolata, duas uncias et ultra in maximo diametro lata, patentia, glabra, plana, apice, marcescentia. Umbella densa, fastigiata. Spatha monophylla, rubro colorata, bi vel trifida, laciniis acutiusculis, pedunculis brevioribus. Pedunculi simplices, unciales, receptaculo carnoso, convexo bulbiformi, demum evanescente, inserti. Petala patentia elliptico-lanceolata, alba vel sordide rubentia, carinâ virente. Stamina simplicia, aequalia, subulata, basi coalita. Germen trilobum, quasi serico glauco-viride indutum.

Folium interius apice inflectitur, geritque bulbillos duos, quos si ante elongationem praedicti folii inspicias, axillares quasi diceret.

Fl. Majo.

Reperi prope Catanam inter segetes solo
argilloso, locisque humidis.

4. *Alyssum calycinum*: caulibus herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus.

Alyssum calycinum Sp. pl. 98. — *Lacq. Austr.* 1. 338. — *Krocker Siles.* 2. p. 39. t. 2. — *Gaertn. De Fruct.* 2. pag. 282. t. 141.

Alysson Cam. *Epit.* 558. f. 1.

Alysson minimum Clus. *Hist.* 2. p. 133.

Thlaspi minus quibusdam aliis *Alysson minus* I. B. *Hist.* 2. p. 928.

Thlaspi Alyssum dictum campestre majus
C. B. P. *Cup. Hort. Cath.* p. 211.

Habitat in Regione sylvosa Montis *Ætnæ*.

5. *Ambrosia maritima*: piloso-subincana: foliis tri-
vel bipinnatifidis, obtusis; racemis termina-
libus, solitariis; receptaculo sotoso-paleaceo.

Ambrosia maritima Sp. pl. 1481. — *All. Ped.* 2. p. 142.

Ambrosia Dod. *Pempt.* 35.

Ambrosia quibusdam I. B. Hist. 3. p. 190.

Ambrosia hortensis procerior Lugd. Hist.
2. p. 1148.

Ambrosia maritima C. B. P. Cup. Hort.
Cath. p. 9.

Planta cinereo-virens pilis molliusculis,
parum amara, aromatica. Radix lignosa, fusi-
formis, ramos quandoque longissimos, horizon-
tales emittens. Caules plurimi, sesqui-vel
bipedales, basi decumbentes, perennantes-
que, teretes, foliosi, ramosissimi, ramis in
paniculam compositis, supernè floriferis. Fo-
lia subtus pallidiora: caulina primora opposi-
ta, petiolo ciliato, tri-vel bipinnatifida, la-
ciniis obtusis, inciso-dentatis; superiora ut
et ramea alterna, sensim minus composita;
summa denique vel floralia simplicia, sessilia,
oblongo-lanceolata, subintegerrima. Flores
alii hermaphroditi abortivi in calyce communi
aggregati, breviter pedunculati, nutantes in
racemo terminali, solitario, erecto; alii foe-
minei fertiles in glomerulis subjectis, bra-
cteolatis.

Herm. Calyx communis monophyllus, haemisphericus, margine crenulatus. Corollae infundibuliformes, quinquedentatae, parum perviae, pallide luteae. Antherae quinque, distinctae. Stylus unicus. Stigma unicum. Receptaculum perpetue setoso-paleaceum.

Foem. Calyx monophyllus, monoflorus, medium versus extus quinquedentatus. Corolla nulla. Stylus bipartitus, exertus. Semen unicum, fuscum, calyce indurato tectum.

Perennis.

Frequens in maritimis Messanensibus et Catanensibus.

Cl. Schmidel paleas setaceas in receptaculo floris masculi Ambrosiae trifidae etiam vidit. (a)

6. *Anchusa undulata*; strigosa; foliis linearibus; dentatis, undulatis; calycibus fructiferis inflatis.

~~.....~~

(a). Confer Gaert. De fructu et sem. pl. v. 2, p. 413.

Anchusa undulata Sp. pl. 191.

Anchusa angustis dentatis foliis hispanica
Barr. Ic. 578. — Bdc. Mus. t. 77.

Abitat in arenosis aridis Regionis Pedemontanae sive cultae Montis Aetnae.

Anthemis biaristata: foliis triplicato-pinnatis,
foliis linearibus planis; squamis calycinis
lanceolatis, margine et apice fuscis, flosculis
biaristatis.

Anthemis biaristata Lam. et Dec. Fl. Gall.
4. p. 204.

Anthemis tomentosa Gouan Illustr. 70. —
Lam. Dict. 1. p. 574. (non Linn.).

Anthemis pubescens Willd. Sp. pl. 2772?

Tota herba 1-2 pedalis lanugine alba, rara
undique obducia. Radix parva fibris obte-
cta. Caules teretes, striati, foliosi, ramosi,
subdichotomi, basi decumbentes, nonnunquam
in locis herbidis erecti. Folia inferiora elon-
gata, petiolata, tripinnata, pinnulis profunde
bi-tri-multifidisve, angustissime linearibus, acu-
tis, mucronulatis, planis; superiora sessilia,

sensim minus composita. Pedunculi uni aut biflori, supernè valdè incrassati, fistulosi, foliosi, quandoque aphylli. Flores magnitudine *Anthemis altissimae*. Calyx haemisphericus, squamis arcuè imbricatis, lanceolatis, acutis, exterioribus margine et apice sphacelatis, interioribus longioribus, infernè glabris, supernè villosis margineque nigricante cinctis. Discus luteus convexus, corollarum limbo quinquèdentato, dentibus binis interioribus aristatis. Ligulae albae, elliptico-oblongae, tridentatae, exsiccatione persepè pallidè flavescens. Semina stipata, tenacissimè receptaculo convexo, paleaceo adherentia, glabra, compressa, alata sive margine et apice albo-membranacea, exteriora verò majora. Paleae flosculis breviores, albae, nitidae, supernè dilatatae, acutae, exteriores apice tantum fuscae ciliateque.

Habitat prope Catanam in locis humidis, in arvis, et etiam inter segetes.

2. *Anthemis fuscata*: receptaculo subconico, pa-

leis oblongis, obtusis, seminibus mucicis;
foliis glabris, pinnato-decompositis,

Anthemis fuscata Wild. *Sp. pl.* 3. p. 2182.

Chamaemelum foetidum hyemale palustre

Cup. Panph. 2. 1. 53. *Bonan.* 4. 173.

T. 1. Herba foetida. Radix tenuis, alba. Caulis
erectus, pedalis ac altior, subpubescens, fo-
liosus, ramosus, ramis erectiusculis, pauci-
florus, infernè teres, supernè angulato-stria-
tus. Folia glabra, inferiora petiolata, bipin-
nata, foliolis bi- tri- multifidisve, lineari-fili-
formibus, subrevolutis, superiora sessilia, per-
gradus minus composita, laciniis basi caulem
amplectentibus. Flores semiunciam ferè lati,
terminales, solitarii, pedunculis pubescenti-
bus, striatis. Calyx glaber squamulis scariosis
fusco-purpureis. Discus luteus, flosculis omni-
bus explicatis haemisphericis. Semiflosculi ra-
dij albi, patentes, nocturni deflexi, oblongi, tri-
dentati, abortivi. Semina disci omnino calva,
obversè pyramidalia, tetraquetra, striata. Re-
ceptaculum subconicum, paleaceum. Paleae

9. Rosculis breviores; dimidii superfloris margi-
ne et apice fuscae.

Habitat in arvis solo argilloso prope Ca-
tanam et Misilmerim.

9. Anthemis *arvensis* receptaculo conico; paleis
lanceolatis; acutis; carinatis; exsertis; foliis
bipinnatifidis, pilosis.

Anthemis *arvensis*. Scop. *Fl. 2620* Sav.
Fl. 2. p. 265.

Chamaemelum *arvense*. *Al. B. d. p. 186.*

Cotula non foetida *Barth. H. 3. p. 120.*

Cotula *altissima* non foetida *Dod.
Pempt. 258.*

Chamaemelum *inodorum*. *C. B. & P. Cup.*

Horq. Cat. p. 47. cum ulonietate scilicet

Frequens in arvis pascuisque apricis Re-
gionis Pedemontanae. *M. Aetnae p. 600.*

Secundum loca variat: caule prostrato;
diffuso, vel erecto; foliis pinnatisve pilosis.

Anthemis *secundiramea*: foliis bipinnatifidis,
glabris; carnosis punctatis; ramis secundis; re-

ceptaculo conico-cylindrico.

T. 2. Radix parva. Caules herbacei, prostrati, pedem vel sesquipedem longi, teretes, glabri, purascentes, foliosi, multiflori, ramosissimi, ramis, ramulisve plerumque secundis, alternis. Folia glabra, carnosa, punctis excavata, glaucescentia, semiunciam aut unciam longa, pinnata foliolis multifidis vel pinnatifidis, laciniis brevibus obtusiusculis, muticis. Pedunculi pubescentes, villis adpressis, supernè incrassati, fistulosi, uniflori. Flores odore Matricariae *Parthenii*, magnitudine Anth. *argensis*. Calyx haemisphaericus, imbricatus, squamis angustis, lanceolatis, carinatis, membranâ albâ margine circumdatis, pilosiusculis vel omnino glabris, apice ex rubro subfuculentibus. Discus flavus, semiellipticus, ligulis albis, patentibus, obtusè tridentatis. Paleae flosculis breviores, concavae carinatae, sublanceolatae, supernè latiores, apice acutae, carinâ virente. Semina obversè pyramidalia, tetraquetra, membranâ dentatulâ coronata. Receptaculum punctatum, conico-cylindraceum.

Habitat in maritimis prope Catanam. *Fl. Signati asciata.*

11. *Arenaria geniculata*: procumbens; ramis elongatis, villosis, filiformibus; foliis linearibus; floribus paniculatis.

Arenaria geniculata Poiret *Tr. 2. p. 166. et Dict. Enc. 6. p. 365.*

Arenaria herniariaefolia Desf. *Atl. 1. p. 359. nomencl. Alsine maritima longius radicata herniariae foliis* Bocca *Sic. p. 18. 7. 10. — Cup. Hort. Cath. p. 6. Panph. 1. 7. 230. f. mila.*

Reperi in maritimis arenosis prope Catanam; praecipuae ad sepes.

12. *Asparagus horridus*: aphyllus; fruticosus; pentagonus; aculeis tetragonis; compressis, striatis.

Asparagus horridus L. *Suppl. 263. Cat. Ic. 2. p. 30. 7. 136. — Desf. Atl. 1. p. 307.*

Asparagus sylvestris praecasso ac rigido folio acuto, nigro *Cup. Hort. Cath. p. 24.*

Asparagus sylvestris, praecrasso ac rigido folio, acuto, coerulea bacca *Cup. Panph. 2. 4. 166.*

Reperi in litore arenoso inter *Tauromenium* et *Giarre*, etiam prope *la Motta S. Anastasia*.

13. *Biserrula pelecinus*.

Biserrula pelecinus *Sp. pl.* 1073. — *All. Pedem.* 1. p. 344. — *Gaertn.* 1. 154. — *Lam. Illust.* 1. 522.

Pelecinus vulgaris *Tourn. Inst.* 417. 1. 234.

Securidaca peregrina *Clus. Hist.* 2. p. 238.

Lunaria radiata *Robini J. B. Hist.* 2. p. 348.

Hedysarum congestis et utrinque *lunatis* siliquis *Barrel. Ic.* 1137.

Astragalus purpureus, annuus; peregrinus, siliquis utrinque *Serrae* similibus *Moris. Cup. Hort. Cath.* p. 26.

Habitat in *Ætna*.

14. *Brassica arvensis*: foliis subcarnosis, glabris; amplexicaulibus; inferioribus spathulatis, superioribus cordato-oblongis.

Brassica arvensis *Mant.* 95. — *All. Ped.* 1. p. 266.

Brassica campestris purpureo flore *Clus. Hist.* 2. p. 127.

Brassica sylvestris fabariae foliis Bocc.
Sic. 49. t. 25. f. 3. 4. — *Cup. Hort. Cath.* p. 32.
cum varietate et Panph. 2. t. 78.

In arvis et ad vias *Fra Paternò, Mister-
 bianco, Regalbuto, Centorbi &c.*

15. *Bromus sylvaticus*: spicâ simplici, nutante, secundâ, spiculis sessilibus teretiusculis; aristis glumâ longioribus; foliis pilosis.

Bromus sylvaticus Pollich *Palat.* 1. p. 118.
Smith Brit. 1. p. 136. — *Savi Pis.* 1. p. 126. —
Bert. Pl. Gen. p. 20. p. 100.

Bromus pinnatus *Fl. Dan.* t. 164.

Bromus gracilis *Wild. Sp. pl.* 438.

Gramen loliaceum, corniculatum, latifolium, spicis teretiusculis angustis et glabris
Scheuchz. Agrost. p. 36.

Gramen loliaceum corniculatum montanum, spicâ partiali subirsutâ fragili *Scheuchz.*
Agrost. p. 38.

In umbrosis et nemorosis *Ætnae.*

16. *Bromus madritensis*: paniculâ erecto-patente subramosâ; flosculis lanpoco latis nervosis sulcatis diandris.

Bromus madritensis Sp. pl. 114. — All.

Pedem. 2. p. 251.

Bromus incrassatus Lam. Dict. 1. p. 468.

Bromus diandrus Curt. Lond. Ic. — Smith

Brit. 1. p. 135.

Bromus sterilis erectâ paniculâ major
Barrel. Ic. 76. f. 1.

Gramen bromoides pumilum, locustis erectis majoribus aristatis Scheuchz. *Agrost. 260.*

β *Idem* toto habitu graciliôr, monandrus.

In *Ætna* frequens.

17. *Bromus tectorum*: paniculâ nutante ramosâ, spiculis pubescentibus linearibus.

Bromus tectorum Sp. pl. 114. — *Leers. Herb.*

p. 38. t. 10. f. 2. — All. Ped. 2. p. 249.

Obvius in *Ætna*.

18. *Bupleurum odontites*: umbellis lateralibus oppositifoliis, subsessilibus, radiis inaequalibus; involucellis pentaphyllis, lanceolato-linearibus, coloratis, longioribus.

Bupleurum odontites Sp. pl. 342. — *Jacq.*

Hort. t. 91. — Savì Duo Cent. p. 63. — All.

Ped. 2. p. 23.

Perfoliatum angustifolium montanum Col.
Ecphr. 1. p. 84. t. 247.

Perfoliata minima Bupleuri folio Moris.
Cup. Hort. Cath. p. 166.

Auriculæ leporis affinis *Odontites lutea*
Valerandi et Dalechampii J. B. *Hist.* 3. p. 201.
 Prope Catanam inter segetes.

19. *Campanula dichotoma* : capsulis 5-locularibus
 obtectis ; caule dichotomo ; floribus cernuis.

Campanula dichotoma Sp. pl. 237. — Desf.
Atl. 1. p. 179. — Jacq. *Collect.* 5. p. 36. t. 12.

Campanula mollis β Wild. Sp. pl. 910.

Campanula hirsuta Ocymi folio caulem
 ambiente, flore pendulo Bocc. Sic. 83. t. 45. —
Cup. Hort. Cath. p. 35. et *Panph.* 2. t. 259.

Habitat in *Ætna* et prope *Messanam*.

20. *Cardamine thalictroides* : foliis simplicibus, ternatis, pinnatisque, foliolis subrotundis trilobis.

Cardamine thalictroides All. *Ped.* 1. p. 261.
 t. 57. f. 1. — Will. Sp. pl. 3. p. 484.

Cardamine Plumieri Will. *Delph.* 3. p. 359.

t. 38.

Nasturtium montanum, nanum, rotundo
Thalictri folio pyrenaeum *Bocc. Mus.* 171.

z. 116. *ascor. asord.*

Habitat in Regione elatiori M. *Ætnae*.

21. *Carex praecox*; spicâ masculâ solitariâ, foemineis geminis, approximatis, oblongis, sessilibus; stigmatibus tribus; fructibus subglobo-so-triquetris, pubescentibus, squamam ovatam, acutam aequantibus.

Carex praecox *Wild. Sp. pl.* 4. p. 262. —
Jacq. Austr. 1. 46. — *Good. Trans. of Linn. Soc.*
 v. 2. p. 170.

Carex filiformis *Leers. Herb.* 204. t. 6. f. 5.

Habitat in *Ætnae* sylva.

22. *Carex Linckii?* spicis androgynis, subbinis, alternis, breviter pedunculatis, supernè masculis; stigmatibus tribus; axillis triquetris, laxis, utrinque acuminatis, ore vix bifidis.

Carex Linckii *Wild. Sp. pl.* 4. p. 222.

Carex (*gynomane*) spiculis lineari-subulatis, alternis, androgynis, supernè masculis, flosculis foemineis, laxis, stigmatibus tribus,

capsulis utrinque attenuatis binerviis subbi-
fidis. Bertol. Pl. Rar. It. Dec. 2. p. 43.

Radix fusca, fibrosa, repens. Culmi gra-
ciles, debiles, adscendentes, a binis uncis ad
pedem usque alti, triquetri, striati, glabri,
basi foliosi. Folia culmo altiora, glauca, an-
gustissime linearia, plana, striata, in margine
scabra. Bractee foliis simillimae, vaginatae,
vaginis abbreviatis, pedunculo subaequalibus vel
brevioribus; inferior culmo altior. Spicae an-
drogynae, plerumque binae, raro 3, 4, aut
solitariae, alternae, subexserto-pedunculatae,
lineari-subulatae. Flores inferiores foeminei
pauciores; superiores masculi plures. Glumae
ovali-lanceolatae, acutae, dorso virides, ner-
vosae, carinatae, margine albo-vel ferrugi-
neo-membranaceae. Fructus glumis acuminatis
breviores, laxi, patuli, triquetri, utrinque
rostrati ore sub lente bifido. Stigmata tria.

Habitat in Aetnae Regione sylvestris.

23. *Carlina corymbosa*: caule multifloro, corymbo-
so; foliis pinnatifidis, dentatis, spinosis; ra-
dio flavo.

Carlina corymbosa Sp. pl. 160. — Desf.
Atl. 2. p. 250. — *All. Ped.* 1. p. 156. — *Savi*
Pis. 2. p. 248. — *Santi Itin.* 2. p. 312. 118.

Acarina Apula umbellata Col. Ecphr. 1.
 p. 20. 27.

Habitat prope Messanam;

Habui ex D. ANTONINO ARROSTO Phar-
 mocopola peritissimo, doctissimoque Botanices
 nostrae patriae cultore.

24. *Catananche lutea*: squamis calycinis inferioribus lanceolatis; foliis lanceolatis, dentatis, trinerviis.

Catananche lutea Sp. pl. 1142. — Gaertn.
De Fruct. 2. p. 356. 1137. — *Lam. Illustr.* 1. 658.
f. 2. — *All. Ped.* 1. p. 207.

Chondrilla cyanoides, lutea, Coronopi folio non diviso Bocc. Mus. p. 21. 1. 7. — *Bar-
 rell. Ic.* 1. 135.

Stoebe Plantaginis folio Alp. Exot. 287.
 1. 286. — *Cup. Hort. Cath.* p. 208.

*Stoebe Plantaginis folio angusto, Parmicae
 Austriacae capitulo* Cup. Pumph. 2. t. 241.

Chondrilla lignosa hirsuta, Plantaginis folio dentato lato, Ptarmicae Austriacae capitulo Bonan. t. 98.

Reperi prope Catanam in humidiusculis.

25. *Caucalis maritima*: humilis, pubescens; foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis, linearibus; umbellâ universali 2-5fidâ, partialibus subtrispèrmis.

Caucalis maritima All. Ped. 2. p. 32. —

Cav. Ic. 2. p. 1. t. 101. — Savi. Pis. 1. p. 292. —

Desf. Atl. 1. p. 238.

Caucalis pumila Willd. Sp. pl. 1385.

Daucus muricatus β Lin. Mant. 352.

Daucus maritimus Gaert. De Fruct. 1. p. 80. t. 20.

Caucalis involucre universali diphyllò; partialibus penthaphyllis Ger. Prov. 137. t. 10.

Caucalis marina, purpurea, Pastinacae sylvestris tenuifoliae folio, echinophoro seminae umbellata Cup. Panph. 2. t. 126. et Hort Cath. p. 42. — Bonan. t. 130.

Habitat in arenosis maritimis prope Catanam.

26. *Centaurea crupina* : calycibus inermibus, squamis lanceolatis; foliis pinnatis scabris, pinnulis serrulatis linearibus acutis.

Centaurea crupina Sp. pl. 1285. — All. Ped. 1. p. 157. — Desf. Atl. 2. p. 292.

Chondrilla purpurea tenuifolia, capite Jaceae, semine Cardui Barr. Ic. 1136.

Centaureum capitatum ciliare annuum foliis laciniatis serratis Moris. Cup. Hort. Cath. p. 43.

Reperi prope la Motta S. Anastasia :

27. *Centaurea napifolia* : calycibus palmato-spinosis; foliis decurrentibus sinuatis spinulosis; radicalibus lyratis.

Centaurea napifolia Sp. pl. 1295. — Desf. Atl. 2. p. 297.

Jacea peregrina napifolia echinatis capitulis caule alato Pluk. Alm. 192. t. 94. f. 2.

Jacea cyanoides purpurea alato caule Cup. Panph. 2. t. 184.

Habitat prope Catanam in arenosis maritimis.

28. *Centaurea paniculata* : calycibus ciliatis, ovatis, adpressis; foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis; caule paniculato.

Centaurea paniculata Sp. pl. 1289. — All. Ped. 1. p. 159. — Savi Duq Cent. p. 188. — Bertol. Pl. Gen. p. 116. — Jacq. Austr. 4. t. 320.

Centaurea majoris species tenuifolia J. B. Hist. 2. p. 31.

Jacea montana dilutè purpurea decumbens, capitulis parvis et multis, Cardui stellati nascentis foliis Cup. Panph. 1. t. 20.

In Ætna repèri.

29. *Centaurea salmantica* : calycibus setulâ reflexâ spinosis, glabris; foliis lyrato-runcinatis, serratis.

Centaurea salmantica Sp. pl. 1299. — Desf. Atl. 2. p. 303. — Jacq. Hort. 1. 64.

Stoebe salmantica prima Clus. Hist. 2. p. 9. — J. B. Hist. 3. p. 36.

Aphyllantes primum Dod. Pempt. 125.

Reperi inter Misterbianco e la Motta S. Anastasia.

30. *Centaurea spherocepala*: calycibus palmato-spinosis; foliis semidecurrentibus: inferioribus lyrato-pinnatifidis; petiolatis; superioribus sessilibus amplexicaulibus.

Centaurea spherocepala Wild. *Sp. pl.* 3. p. 2311. — *Desf. Atl.* 2. p. 298.

Centaurea coespitosa Cyril. *Pl. Rar. fasc.* 1. p. 244. t. 8.

Jacea maritima incana capite purpureo spinoso; major *Barrel.* *Ic.* 1217.

Jacea marina purpurea, humum sternens;
Tichorii folio *Cup. Hort. Cath.* p. 101. et *Sppl.* alt. p. 41.

Jacea cyanoides marina supina, *Cyani Turcici* quodammodo foliis spinosis, flore purpureo *Cupr. Panph.* 1. et. 193.

Reperi prope Catanam in arenis ad litora maris.

31. *Crepis leontodontoidea*: foliis runcinatis, dentatis, petiolis hirtis; scapo subnudo adscendente; squamis calycinis exterioribus linearibus adpressis.

Crepis leontoides Willd. *Sp. pl.* 3, p. 1593.
All. Auct. ad fl. Ped. p. 13.

Barkausia leontodon Lam. et Dec. *Fl. Gall.*
 4. p. 43.

Habitat in sylva et ad sepes umbrosas M.
Ætnae.

82. *Euphorbia terracina?* (a) umbellâ quinquefidâ
 dichotomâ; foliis obcordato-cuneiformibus,
 lanceolatisque, margine tenuissimè serrulatis;
 nectarîi cornibus setaceis; capsulâ laevi.

Euphorbia terracina Sp. *pl.* 654.

Tithymalus marinus, folio retuso, terra-
 cinus *Barrel. Ic.* 833.

Frutex sesquî-vel bipedalis, lætè viridis,
 glaber, foliis, involucris, involucellisque mar-
 gine tenuissimè serrulatis, apice mucronula-
 tis. Radix lignosa. Caulis prima sua etate
 subsimplex, dein e basi ramosissimus, ramis
 teretibus, erectis vel patulis, infernè una

(a) *Euphorbia italica* Syn. H. R. P.

cum caule rubescentibus, apice floriferis. Folia sparsa, figurâ varia: in ramis junioribus obcordato-cuneiformia vel spathulato-oblonga, in caule primario, ramisque adultioribus lanceolata, acuta, 1-2 uncias longa, 2-5 lineas lata. Umbella quinquefida dichotoma aut bifida cum flore solitario fertili in bifurcatione radiorum, ramis axillaribus paucis vel nullis. Involucrifoliola ovato-lanceolata. Involucella, cordato-reniformia, basi subtruncata, serraturae dentibus aliquot prominentioribus, hinc sinu quandoque excavata. Nectaria quatuor semiorbicularia, flava, bicornia, cornibus setaceis. Capsulâ omnino laevis, glabra. Semina alba vel grisea, ovoidea, levissima, funiculo umbilicali pileato, pileo orbiculari, umbonato.

Habitat in Ætnae Regione Pedemontana et etiam in arenosis maritimis prope Carenim.

33. *Festuca uniglumis*: paniculâ secundâ, erectâ, subsimplici; flosculis subulatis compressis aristatis; calycis valvulâ alterâ brevissimâ.

Festuca uniglumis Smith Brit. I. p. 118. — Wild. Sp. I. p. 423.

Stipa membranacea Sp. pl. 416. ?

Habitat in arenosis maritimis prope Catanam.

34. *Festuca divaricata*: culmo basi geniculato; spiculis compressis, elongatis, muticis, paniculato-divaricatis.

Festuca divaricata Desf. Atl. 1. p. 89.

2. 22. Pers. — Syn. pl. 94.

Habitat in arenosis maritimis prope Catanam.

35. *Frankenia pulverulenta*: floribus solitariis, petalis subrepandis; foliis subrotundo-ovatis, subtus pulverulentis.

Frankenia pulverulenta Sp. pl. 474. — *Savi Duo Cent.* p. 92. — *Lam. Illustr.* 2. 262. f. 3. — *Desf. Atl.* 1. p. 316. — *All. Ped.* 2. p. 90.

Anthyllis maritima, *Chamaesicae* similis
C. B. P. *Cup. Hort. Cath.* p. 19.

Anthyllis valentina Clust. *Hist.* 2. p. 186.

Habitat in littoribus maritimis prope Catanam a lu Signuri asciatu, a l' Ognina etc.

36. *Fritillaria meleagris*: foliis omnibus alternis; caule unifloro; nectario lineari.

Fritillaria meleagris Sp. pl. 436. — Desf.

Atl. 1. p. 433. — *Curt. Land. Ic.* — *Lam. Illustr.*

1. 425. f. 1. — *Ceter. Fl. Dan.* 1. 972. — *All. Ped.*

2. p. 160. — *Jacq. Austr. Append.* 1. 32.

Meleagris Dod. *Pempt.* 233.

Fritillaria Clus. *Hist.* 152.

Meleagris sive *Fritillaria* saturatior et di-

lutior J. B. *Hist.* 1. p. 681.

Habitat prope Messanam a lu Stoppu.

D. ARROSTO communicavit.

37. *Geranium laciniatum*; foliis radicalibus cordato-ovatis, inciso-lobatis; caulinis bipinnatifidis; pedunculis folio longioribus multifloris; caule prostrato.

Geranium laciniatum Cav. *Ger.* p. 228.

1. 113. f. 3. — *Desf. Atl.* 2. p. 110.

Geranium marinum, *Malvae* folio oblongo asperiusculo, quinque petalis distincto *Cup.*

Panph. 2. 1. 257.

Geranium Altheae folio tenuiter dissectum

Cup. Panph. 2. 1. 11.

Geranium marinum humicaule *Altheae* fo-

Geranium Argemones coesura *Cup. Pānph. 2. t. 150.*

Geranium marinum, *Altheae foliis pulchrè laciniatis, petiolis cruentis, flore rubello, vel purpureo-rubro. Cup. Hort. Cath. p. 85. et Suppl. Alt. p. 32.*

Geranium marinum Argemones foliis *Cup. Hort. Cath. ibidem.*

In arenis ad littora maris prope Catanam reperi.

38. *Geranium ciconium*: pubescenti-viscidum: pedunculis multifloris; foliis bipinnatifidis, dentatis, costâ inter pinnas dentatâ; caule adscendente.

Geranium ciconium *Sp. pl. 952. — Desf. Atl. 2. p. 112. — Cav. Ger. p. 228. t. 95. f. 2. — Jacq. Hort. t. 18. — Savi. Pis. 2. p. 120. — All. Ped. 2. p. 35.*

Geranium apulum coriandrifolium *Cal. Ephr. 1. p. 136. t. 135.*

Geranium Chrysanthemi cretici folio *Neapolitanum Bocc. Mus. p. 39. t. 83.*

Geranium speciosum, Matricariae crescen-

tis quodantenus foliis, acu longissimâ ac robustissimâ odorum *Cup. Hort. Cath. p. 85. et Suppl. Altr. p. 32*

Reperi prope Catanam in Villa Rascosa.

39. *Hedysarum pallidum*: cano-cinerascens; caule procumbente; foliis pinnatis, ellipticis, subtupubescentibus; lomenti articulis subrotundis muricatis.

Hedysarum pallidum Desf. Atl. 2. p. 177. —

Willd. Sp. pl. 3. p. 1210.

Onobrychis major humi projecta, longulocordato foliolo, floribus rubris, clypeatis articulatis siliquis sparsis *Cup. Hort. Cath. p. 156. et Suppl. Altr. p. 66.*

Hedysarum minus purpureum repens siliquis clypeatis sparsis. *Cup. Panph. 2. t. 136. — Bon. t. 100.*

Habitat in collibus prope Catanam nella contrada di Pintudatiilu.

40. *Hesperis ramosissima*: pubescens, incana; caule ramosissimo; foliis lineari-lanceolatis, dentatis, obtusis; siliquis pedunculatis.

Hesperis ramosissima Will. Sp. pl. 3. p. 532.

Hesperis (*ramosissima* ;) pubescens foliis lanceolatis dentatis; siliquis subsessilibus torulosis filiformibus bimucronatis *Desf. Atl. 2. pag. 1. r. 161.*

Folia inferiora obovata, petiolata; superiora sessilia, lineari-oblonga vel lanceolata, obtusa, omnia parcè denticulata, quandoque subintegerrima. Siliquae pedunculate, lineares, torulosae, teretes, patentes mucronulo obtuso apice terminatae. An ideo diversa species?

Habitat in arenosis maritimis prope Catanam.

41. *Hordeum maritimum*: flosculis lateralibus masculis brevius aristatis, dorso glabris; flosculorum lateralium foliolo interiore semiovato.

Hordeum maritimum Smith Brit. 1. p. 156. Fl. Dan. t. 630. — Persoon Syn. pl. 1. p. 108.

Hordeum geniculatum All. Ped. 2. p. 259. t. 91. — Savi Pis. 1. p. 146.

Gramen hordeaceum pumilum Clusii Cup. Panph. 2. r. 82. et Hort. Cath. p. 89.

Gramen spicatum secalinum maritimum minus Scheuchz. Agrost. 18.

Reperi prope Catanam in arenosis maritimis.

42. *Hordeum strictum*: flosculis lateralibus masculinis muticis, involucris aristatis scabris, radice bulbosâ.

Hordeum strictum Desf. *Atl.* 1. p. 113.
 7. 137. — *Persoon Sin. pl.* p. 108.

Hordeum bulbosum Bert. *Pl. Gen.* p. 25. —
Viviani Fragm. It. ap. Ann. bot. vol. 1. part. 2.
 p. 147. — Desf. *Atl.* in emendationibus ad calcem
 secundi voluminis, (non *Lin.* secund. *Persoon*).

Hordeum nodosum Savi *Duo cent.* p. 37.
Gramen hordeaceum leptocaulos praealtum
macrostenostachyon Cup. *Panph.* 1. 2. 114.
et Hort. Cath. p. 89.

Gramen secalinum bulbosâ radice seu ex
Aleppo Bauhini Scheuchz. *Agrost.* p. 19.

In *Ætnae* locis gramineis.

43. *Hyppochaeris arachnoides*: foliis dentato-sinuatis; caule ramoso, nudo; pappis disci stipitatis plumosis, radii sessilibus, setis basi arenoso-plumosis.

Hypochaeris arachnoides *Poirer Dict. Enc.*
5. p. 572. — *Desf. Atl. 2. p. 238. sub minima.*

Hypochaeris minima *Wild. Sp. pl. 3. p. 1621.*

Foliis plerumque piloso-setosis, calycibus
poenitus glabris in *Ætna* occurrit. •

44. *Iris pumila*: barbata; scapo unifloro, foliis ensi-
siformibus glabris brevioribus; tubo exerto; pe-
talis oblongis obtusis.

Iris pumila *Sp. pl. 56. — Jacq. Austr. t. 1.*

Chamaeris latifolia minor *Clus. Hist. 1.*
p. 225. et 226.

Iris lutea, praecox, purpureo-rubro la-
bello magno, dimisso, margine lutea *Cup.*
Hort. Cath. p. 103.

Iris lutea labello purpureo atrorubente
margine luteo *Cup. Panph. 2. t. 260. — Bon. t. 17.*

Multiplices hujus Iridis varietates ad
tres utpote primarias reduci possunt.

α Flore violaceo.

β Flore luteo.

γ Laciniis corollae interioribus luteis, exte-
rioribus violaceis.

Habitat in collibus propè Catanam. *Nella contrada di S. Gregorio.*

45. *Iris sisyrinchium*: vix barbata; foliis linearibus; canaliculatis, reflexis; bulbis superimpositis.

Iris sisyrinchium *Sp. pl.* 59. — *Desf. Atl.* 1. p. 38.

Sisyrinchium medium C. B. P. *Cup. Hort. Cath. Suppl. alt.* p. 83.

Sisyrinchium majus et minus *Claus. Hist.* 1. p. 216.

Iridi bulbosae affinis sisyrinchium majus et minus *J. B. Hist.* 2. p. 708.

Scapus multiflorus, floribus singillatim matutinis aut vespertinis oris e spatha prodeuntibus, mox sub sole marcescentibus. Petala violacea, rarissimè alba. Tria exteriora majora, reflexa cum maculâ helvolâ ad basin laminae, nequaquam vero loco barbae. Hujus enim lineola lutea per medium unguis evidenter excurrit. Folia reflexa, arcuatim flexuosa nec undulata.

Habitat in arvis et ad littora maris propè Catanam, Panormum &c.

46. *Iris tuberosa*: imberbis, foliis tetragonis.

Iris tuberosa Sp. pl. 58.

Iris tuberosa folio anguloso C. B. P. Cup.

Hort. Cath. p. 103.

In *Ætnæ* campis.

47. *Linaria pelisseriana*: foliis surculinis ovatis ternis, caulinis linearibus alternis; calcaribus flore longioribus.

Antirrhinum pelisserianum Sp. pl. 855. —

All. Ped. 1. p. 66.

Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus *Magn. Monsp.* 159.

Chamoelinaria violacea Italica *Barr. Ic.* 1162

Linaria tenuis spanophylla *Tithymali Cyparissii* folio, flore purpureo *Cup. Panph.* 1. 7. 229.

Linaria gracillima spanophylla minoribus paucisve floribus *Cup. Hort. Cath.* p. 113.

In *Ætnæ* campis.

48. *Linaria reticulata* (a) foliis linearibus canaliculatis sparsis, surculorum radicalium subquinis; racemis elongatis, rachi calycibusque pubescentibus.

(a) *Antirrhinum subulatum* Syn. H. R. P.

Linaria reticulata Desf. *Atl.* 2. p. 48.

Antirrhinum reticulatum Willd. *Sp. pl.* 3
p. 247. — *Vent. Dict. Enc.* 4. p. 357.

Antirrhinum pinifolium Poiret *It.* 2. p. 193.

Linaria sicula multicaulis molluginis fo-
lio Boc. *Sic.* 38. t. 19. f. 1. — *Cup. Hort. Cath.*
p. 113. *sidul. n. sicula.*

Linaria angustifolia vulgari similis Ray
Cup. Hort. Cath. Suppl. alt. p. 55.

Linaria lutea folio capillo paulo crassiori
Cup. Panph. 2. t. 65. *sidul. n. lutea.*

N. Synon. Bocc. hic certo spectat. *Antirrhini-*
num multicaule nondum in Sicilia inventum,
quamvis *Siculum* fecerit Linnaeus.

Flores luteum colorem præ se ferentes palatu
variant venis purpureis reticulatis picto vel
avenio. Bracteae pedunculo floris longiores;
fructus vero breviores.

Habitat in *Ætna*, prope *Panormum* et
alibi frequenter in campis.

49. *Lotus parviflorus*: hirsutus, foliolis obovatis,
stipulis subcordatis; pedunculis multifloris;

calycibus corollam aequantibus.

Lotus parviflorus Desf. *Atl.* 2. p. 206.

2. 211. — *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1394.

Habitat prope Messanam all'Arcipeschiere
D. ARROSTO.

50. *Marchantia glauca* : glabra ; receptaculis foemineis in lineam ordinatis , trilobis , lobis latere dehiscentibus.

Marchantia triloba Gmel. *Syst. nat.* 9.
p. 1354. ?

T. 3. Dioica , rarius monoica. Frons prolifera , plana , parum pinguis , terrae incumbens , cuneiformis , integra vel bifida lobis , apice obtusis , emarginatis sinu ciliorum incurvorum capillitium ex albido fusco - purpurascens amplectente , pagina superiori glauca , glaberrima , absque nempe granulis cellulisve prominentibus nec ullo sulco exarata ; internè membranâ tecta atro - purpureâ , squamatim lacerâ , fibrillis longis confertissimis rufis e costa prodeuntibus radicans , margine libero , crispato ,

Fl. Masc. Petrae granulatae, sessiles, scabrae, in lineam longitudinalem supra pronam frondis superficiem ordinatae, coronâ ciliorum

Foem. Receptacula sive Perichetia in li-

neam pariter disposita, stipitata stipite 3-4 lineas longo, pellucido, pilorum fasciculo insertionis loco vaginato, bi vel tricoeca, coarctatis singulis bivalvibus, latere erumpentibus; internodiis unicapsuliferis. Capsulae nigrae, sphaericae, uniloculares, seminibus numerosis fusceis, belateris affixis refertae, absque ullo ordine dehiscentes.

Habitat in Ætnae fissuris rupium.

Nardus aristata. spicâ setaceâ incurvâ, calycibus aristatis.

Nardus aristata Sp. pl. 78. — All. Ped. 2.

p. 231. — Savi Duo Cent. p. 12. — Villars

Delphin. p. 58. t. 2.

Rottbolla monandra Cav. Ic. 2. 39. f. 1. —

Viviani Pragmat. apud Ann. bot. vol. 1. p. 2.

pag. 147.

Gramen lexile arundinaceum, minimum
 mucumque reflexo. *Bocc. Mus. 74. f. 57. — Scheuchz.*
Agrost. 402. f. 7. K. miscodisquis abbas.

Gramen junceum nodosum, minimum ca-
 pitulum pillare. *Barr. Ic. 17. f. 1. 308. —*

Habitat in siccis et sterilibus prope Mes-
 sanam. D. ARROSTO. Sic. 17. f. 1. 308. —

520. Ononis variegata : floribus subpedunculatis,
 axillaribus ; foliis simplicibus, lobovatis, stria-
 tis, nervosis ; stipulis ovatis, dentatis ; caule
 procumbente.

Ononis variegata. *Sp. pl. 1008. — Savi*
Duo Cent. p. 136. — Desf. Atl. 2. p. 142. 185.

Ononis maritima mitis folio lucido serra-
 to. *Bocc. Sic. 7. f. 38. f. 3. — Cup. Panph. 2. r. 25.*

Anonis maritima lenis, rigidiusculo folio
 integro, alte crenato. *Cup. Horr. Cath. p. 18.*
Suppl. Atl. p. 8.

Habitat prope Catanam in arenis ad lit-
 tora maris cum sequentibus.

531. Ononis ramostylis : pubescenti-viscida ; pe-
 dunculis unifloris, aristatis, folio duplo lon-

gioribus; foliis ternatis, lineari-obovatis; floribus cernuis.

Ononis ramosissima Desf. *Atl. T. p.* 142.
186. — *Widl. Sp. pl.* 3. p. 106.

Ononis viscosa spinis carens lutea major
B. Polifolio crispo. *Cup. Panph.* 1. 2. 156. et
Hort. Cath. p. 17.

Anonis lutea major serratis foliis, exispis,
viscosis. *Cup. Hort. Cath. Suppl. ult. p.* 8.

Ononis mitissima; floribus sessilibus spicatis;
bracteis stipularibus, ovatis, ventricosis, sca-
tidosis, imbricatis.

Ononis mitissima Sp. *pl.* 1007.

Anonis alopecuroides in eis annua purpu-
rascens *Dill. Elth. 1. 24. f.* 27.

Anonis purpurea trifolia serrata hirsuta,
floribus in Thymi capitulum nutans arrectis
Cup. Panph. 2. 1. 181. — Hort. Cath. p. 18.

T. 4. *Ophrys tenthredinifera*: bulbis subrotun-
dis caule folioso; nectarii labio villosa, obcor-
dato, appendiculato, appendiculâ sursum versâ;
petalis patentibus obtusis; operculis brevissi-
mis villosis.

Ophrys tenthredinifera Willd. Sp. pl. 4. p. 67.

Ophrys insectifera A. rosea Desf. Atl. 2.

P. 320. A. 2. C. ambigua A. 2. C. 1000

Orchis ornificiflora genata rubiginosa am-
bitu viridi Cup. Panph. 1. 2. 176. Bonan. 1. 28.

Orchis orniflora, amplo labello genato,
rubigineo, ambitu viridi, larvulam fictitante

Cup. Hort. Cath. p. 158. A. 2. C. 1000

Habitat in collibus prope Panormum, Ca-
tanam &c.

36. T. 5. *Ophrys lutea*: bulbis subrotundis; caule
folioso; nectarii labio apice trilobo, lobo me-
dio productiori, rotundato, emarginato, mutico;
petalis patentibus, concavis; operculis lanceo-
latis, duplo brevioribus.

Ophrys lutea Willd. Sp. pl. 4. p. 60. — Cav.
Ic. 2. p. 46. t. 160. — Viviani Fragg. Ital. ap. An.
bot. vol. 1. part. 2. pag. 185.

Ophrys insectifera Sp. pl. 1343.

Habitat in collibus et pratis prope Pa-
normum, Catanam &c.

57. *Ophrys aranifera*: bulbis subrotundis caule fo-

lioso; nectarii labio convexo, rotundato, villosis
et osorum binis lineolis glabris, integro vel
necutrido, segmento medio emarginato; petalis
sensu patentibus; operculis lanceolatis brevioribus.

Ophrys arandifera Wild. Sp. pl. 4. p. 66. —

Bertol. Pl. Gen. 123. — Smith Brit. 3. p. 939.

Orchis fucifera Curt. Lond. Ic.

Orchis fucum referens colore rubiginoso

Vaill. Par. 146. t. 31. f. 15. 16.

Orchis ornifuciflora purpurea fuliginea tor-

quæta Cyp. Panph. 2. 1. 234.

Orchis Psittaco-fuciflora fuliginea Bonan.

37.

Bulbi ovato-subrotundi. Caulis spithameus, teres, erectus, foliosus. Folia radicalia et caulina inferiora patentia, oblongo-lanceolata, striata, basi vaginantia, tres uncias longa, decem lineas circiter lata; caulina superiora sic ut bracteae spathiformia, erecta. Flores inodori in Rachi longâ subtriquetrâ rare spicati. Bracteae flore parum breviores. Petala viridia, in triangulum expansa, ovato-lan-

ceolata, dorso carinata, margine revoluta. Opercula pariter patentia, linearia vel lanceolata, petalis breviora, e virid olivaceo dilute purpurascencia, margine undulis crispata vel plana. Nectarii labium rotundatum, convexum, saepius integrum, aliquando trifidum, segmento medio emarginato, mutico vel breviter appendicato, tuberculis duobus ad basia praeditum micantibus ac si ocula; ambitu flavescens, glabrum, disco holo-sericeum, fusco-purpureum cum binis protuberantibus binisque lineis glabris lucidis e transversali parallele decurrentibus. Columna porrecta, acuta, fornicata. Germen lineare hexagonum.

Frequens in pascuis collibusque circa Panormum Catanam &c.

52. *Orchis sambucina*: bulbis palmatis; caule folioso; nectarii labio laeviter trilobo crenato; petalis binis lateralibus reflexis; cornu conico germine paulo breviora; bracteis florum longitudine.

Orchis sambucina Sp. pl. 1334. Fl. Svec.

312. — *Jacq. Austr. t. 108. — Bertol. Pl. Gen.*
p. 121.

Orchis panonica VIII. Clus. Hist. p. 269.

Variat floribus flavis, incarnatis et purpureis.

Habitat in Aetnae regione celsiori, et silvis.

59. *Orchis laxiflora* : bulbis subrotundis, caule folioso ; nectarii labio trilobo, denticulato, lobo medio emarginato ; petalis binis, lateralibus reflexis ; foliis lineari-ensiformibus.

Orchis laxiflora Lam. et Dec. Fl. Gall. 3.
p. 247. — Poir. Dict. Enc. 4. p. 591.

Orchis ensifolia Villars Delph. 2. p. 29. —
Wild. Sp. pl. 4. p. 25.

Orchis morio foemina procerior majori
flore Vail. Paris. 150. t. 31. f. 33. 34.

Orchis palustris lobato atro-purpureo flore, angustiori folio Bonan. t. 32. — Cup. Fanph.
2. t. 221.

Habitat prope Catanam a la Panatru, et
prope la Piana della Grece locis udis della
Pizzuta.

69. *Orchis variegata*: bulbis subrotundis, caule folioso; nectarii labio tripartito, laevi, lobis apice, dentatis, medio majori emarginato cum mucronulo interjecto; cornu bracteisque germine brevioribus.

70. *Orchis variegata* Willd. *Sp. pl. 4. p. 21.* —

Bertol. *Pl. Gen. p. 119.* — Jacq. *Collect. 2. p. 257.* —

71. *Orchis* 3. v. 599.

72. *Orchis* seu *Cynosorchis galeata*, purpurea

73. *Leucosticta*, sponsum ornatum effingens Bonan.

tab. 35. — *Cup. Hort. Cath. Suppl. alt. p. 68.* —

74. *Panph. 2. v. 165.*

Habitat in Etna, et in Montibus circa

75. *Panormum*

76. *Orchis undulatifolia*: bulbis ovatis, caule folioso; nectarii labio tripartito, scabro, laciniis lateralibus angustissimis, mediâ elongatâ, bifidâ, appendiculatâ; foliis undulatis, maculatis.

77. *Orchis longicruris* Willd. *Sp. pl. 4. p. 22.*

T. 6. Bulbi duo ovati majusculi fibris duplici ordine superimpositis; Caulis erectus, foliosus, infernè teres, supernè angulatus;

sulcatusque ; ad pedem usque altus . Folia glauca , purpureo - maculata , undulata , 3-4 uncias longa , 8-12 lineas in maximo diametro lata : radicalia et caulina inferiora patentia , oblongo - lanceolata , caulina superiora erecta vaginantia . Flores odori in spicâ densâ , ovatâ . Petala rosea vel albo-carnea nervis saturioribus , lanceolata , acuta , distincta , conniventia in cucullum , opercula machinulamque genitalem tegentem . Nectarîi cornu germine intorto , linearî , exagono , duplo ferè brevius , infernè compressum , obtusum , laeviter emarginatum . Labium rubro-punctatum , scabrum , tripartitum , laciniis lateralibus angustissimis , mediâ elongata bifidâ cum appendiculâ linearî-subulatâ interjectâ . Bracteae albo-membraceae , germine duplo triplove breviores , macula vel lineolis rubris persèpè notatae , apice acutae , quandoque dentatae .

Fl. Majo .

Habitat in collibus prope Catanam *nella Contrada di Piniulattilu* .

62. *Osmunda lunaria* : fronde pinnatâ, basi spiciferâ , pinnulis lunulatis crenatis .

Osmunda lunaria *Sp. pl.* 1519. — *All. Ped.*

2. p. 282. — *Lam. Illustr.* 1. 865. f. 1. — *Fl. Dan.* 1. 18.

Botrychium lunaria *Lam. et Dec. Fl. Gall.*

2. p. 569.

Lunaria minor *Matth.* — *Camer. Epist.* 643.

Lunaria botrytis *J. B. Hist.* 3. p. 709.

Habitat in pascuis elatioribus M. Ætnae .

63. *Phalaris alpina* : paniculâ cylindricâ , tenui, spiciformi ; glumis calycinis mucronatis, linearibus, dorso ciliatis .

Phalaris alpina *Lam. et Dec. Fl. Gall.* 3.

p. 9. — *Persoon Syn. Pl.* 1. p. 79.

Phalaris phleoides *Savi Pis.* 1. p. 58. (non *Lin.*).

Phleum Michellii *All. Ped.* 2. p. 233.

Phleum phalaroideum *Vill. Delph.* 2. p. 233.

Gramen tiphynum junceum perenne *Barr.*

Ag. 21. f. 2.

Gramen Tiphoides alpinum , spicâ graci-

liori, delicatâ et villosâ *Scheuchz. Agrost. p. 65.*

Gramen spicatum, saxatile, glabrum, perenne, spicâ cylindraceâ, rufescente, longâ, locustis acutis ciliî instar pilosis *Tilli Hort. Pis. p. 72.*

Habitat in pascuis elatioribus M. Ætnæ.

64. *Polypodium leptophyllum*: frondibus bipinnatis, sterilibus brevissimis; pinnis cuneiformibus, lobatis.

Polypodium leptophyllum Sp. pl. 1553.

Osmunda leptophylla Savig. Dict. Enc. 4. p. 657.

Acrosticum leptophyllum Lam. et Dec. Fl. Gall. 2. p. 565.

Adiantum filicinum leptophyllum elatius hispanicum Barr. Ic. 431.

Habitat in Ætnæ rimis petrarum humidis,

65. *Ranunculus flammula*: foliis ovato-lanceolatis, obtusiusculis, petiolatis; caule declinato.

Ranunculus flammula Sp. pl. 772. — Curr. Lond. Ic. — Fl. Dan. 2. 575. — Desf. Atl. 1. p.

435. — *Savi Pis.* 2. p. 24. — *All. Ped.* 2. p. 48.

Flammula Ranunculus Dod. *Pempt.* 432.

Habitat in locis humidis prope Catanam
a lu Pantanu.

66. *Ranunculus hirsutus*: calycibus retroflexis, acuminatis; caule erecto, multifloro, hirsuto; foliis inferioribus trilobatis vel ternatis, inciso-crenatis; radice fibrosa.

Ranunculus hirsutus *Smith Brit.* 2. p. 592. — *Curt. Lond. Ic.*

Ranunculus phylonitis *Poiret Dict. Enc.* 6. p. 118. — *Willd. Sp. pl.* 1. p. 1324.

Ranunculus agrarius *All. auct. p.* 27. — *Poiret Dict. Enc.* 6. p. 117.

Ranunculus intermedius *Poiret Diet. Enc.* 6. p. 116.

Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirsutis *J. Bauh. Hist.* 3. p. 417.

Habitat prope Catanam cum precedenti.

67. *Ranunculus spicatus*: foliis radicalibus rotundatis, lobatis incis; caule simplici, villos, paucifloro; seminibus longe spicatis.

Ranunculus spicatus Desf. *Atl.* 1. p. 438.

2. 115. — *Lam. et Dec. Fl. Gall.* 4 p. 898.

Habitat prope *la Piana delli Greci* locis
udis della *Pizzuta*. P. Russo.

68. *Rumex spinosus*: floribus androgynis; calycibus foemineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexis spinosis.

Rumex spinosus Sp. pl. 481.

Beta cretica semine aculeato C. Bauh.
Prod. 57.

Beta cretica semine spinoso J. Bauh. *Hist.* 2.
p. 962. — *Cup. Hort. Cath.* p. 29.

Habitat in pascuis M. *Ætnae* et etiam
prope *Panormum all' Abbate*.

69. *Rumex scutatus*: floribus hermaphroditis; foliis cordato-hastatis.

Rumex scutatus Sp. pl. 480. — Desf. *Atl.* 1.
p. 321. — *All. Ped.* 2. p. 203.

Oxalis rotundifolia Dod. *Pempt.* 649.

Acetosa atro-virenti folio Ætneensis Cup.
Hort. Cath. p. 3.

Oxalis folio rotundiore repens J. B. *Hist.*
2. p. 991.

β . Idem foliis glaucis, caulibus basi persistentibus.

Rumex glaucus Jacq. Ic. rar. 1. t. 67. —

Collect. 1. p. 64.

Acetosa rotundifolia hortensis, subrotunda folio candicante Cup. Hort. Cath. ibidem.

Habitat in Ætna. Variet. α inter acervos arenarum regionis elatioris, β inter lapides regionis Pedemontanae.

70. *Scorzonera resedifolia*: foliis linearibus, pinnatifidis, dentatis, glabris; calycibus apice albidis - cartilagineis; caule erecto.

Scorzonera resedifolia Sp. pl. 1113.

Chondrilla sicula, tragoponoides, maritima Boc. Sic. p. 13. t. 7. f. 4. et C.

Habitat in arenosis maritimis prope Catanam.

71. *Scrophularia lucida*: foliis inferioribus subbipinnatifidis, dentatis, glaberrimis, lucidis; racemis dichotomis; tubo corollae lamellula instructo.

Scrophularia lucida Sp. pl. 865. — Desf.

Atl. 2. p. 54. — *All. Ped.* 1. p. 70.

Scrophularia glaucofolio in amplas lacinias
diviso *Tournef. It.* 1. p. 221.

Scrophularia saxatilis, lucida, *laserpitii*
Massiliensis folio Bocc. Mus. 2. 117.

Scrophularia cretica prima Clus. Hist. 2.
p. 209.

Habitat in *Ætnae prima regione sive Pe-*
demontana.

Scutellaria Columnae: foliis oblongis, cor-
datis, serratis, pubescentibus; spicis elongatis,
secundis; bracteis petiolatis, ovatis, calyce
brevioribus.

Scutellaria Columnae Wild. Sp. pl. 3. p.
175. — *All. Ped.* 1. p. 40. t. 84. f. 2.

Cassida Column. Ephr. 1. p. 187. t. 189.

Scutellaria peregrina folio Lamii Cup. Hort.
Cath. p. 198.

In *Ætna frequens precipuè prope li Ca-*
sed. li a lu Milu.

72. *Senecio viscosus*: corollis revolutis, foliis pin-
natifidis, viscidis; squamis calycinis laxis, lon-
gitudine perianthii.

Senecio viscosus Sp. pl. 1217. — *Alt. Ped.*

1. p. 200.

Senecio hirsutus, viscidus, graveolens Dill.
Eth. 1. 258. f. 336.

Senecio hirsutus viscidus major odoratus
J. B. Hist. 2. p. 204.

Habitat in *Ætna* prope *Misterbianco* ad
rudera.

73. *Senecio crysanthemifolius*: radio patente; fo-
liis ex integro profunde bipinnatifidis, denta-
tis, margine subrevolutis: inferioribus petio-
latis, superioribus sessilibus amplexicaulibus;
caule ramosissimo.

Senecio crysanthemifolius *Poir. Dict.*
Enc. VII. p. 96.

Jacobaea sicula Chrysanthemi facie *Bocc.*
Sic. p. 66. t. 67. — Bonan. t. 162. — Cup. Panph.
1. t. 105. — Hort. Cath. p. 102.

*Jacobaea Ætnea Persici folio crasso glau-
co* *Bonan. t. 162. — Cup. Panph. 1. t. 70.*

Jacobaea Ætnica Chrysanthemi segetum
Lob. folio umbellifera *Bonan. t. 167. — Cup.*
Panph. 2. t. 139.

Jacobaea orinos, latifolia, *Isatidis sativae* folio, laeviter dentato, *Ætnensis Bonan. t. 161.* — *Cup. Panph. 2. t. 43.*

Jacobaea Ætnensis, folio oblongo, laciniato, nervoso *Bonan. t. 161.* — *Cup. Panph. 2. t. 43.*

Jacobaea laciniata cornu cervi, forcellæ modo *Bonan. t. 160.* — *Cup. Panph. (apud Catanam) 1. t. 163.*

Jacobaea Ætnica, *Isatidis* folio molli ac madido flore, medio albo, medio luteo *Bonan. t. 160.* — *Cup. Panph. (apud Catanam) 1. t. 163.*

Jacobaea Ætnea &c. Cup. Hort. Cath. p. 102. lin. 18. 19. 21.

Planta quam maximè polymorpha.

Radix horizontalis, lignosa, fibras albas, numerosas emittens. Caules plures, 1-2 pedales et ultra, erecti, angulato-teretes, glabriusculi, foliosi, ramosissimi, infernè purpurascens. Folia viridia paginâ inferiore pallida, vel utrinque glauca, circumscriptione obovata vel oblonga, integra vel bipinnatifida, extremis per intermedia individua sensim conjunctis,

laciniis tunc linearibus, acutis, distantibus, 3-4 uncias longa, tres uncias in maximo incremento lata, alterna, lanulâ rarâ utrinque vestita, margine dentata, subrevoluta: inferiora petiolata, superiora sessilia, amplexicaulia. Corymbi terminales, pedunculis partialibus bracteolatis, bracteis subulatis. Flores lutei, radiati. Calyx glaber, cylindraceus, foliolis aequalibus, conniventibus, linearibus, apice nigris, acutis, squamis ad basin cinctus paucis, brevibus, adpressis, subulatis, apice etiam nigris. Flosculorum discus lineas octo in diametro ferè latus, extra calycem haemisphericè prominens. Ligulae 12-13, patentes, oblongae, calyce longiores, apice vix tridentatae, demum revolutae. Semina oblonga, angulata, villis albida adpressis, sursum versis. Pappus simplex, sessilis. Receptaculum areolatum, areolis mammillatis. Perennis. Fl. hieme et per totam aetatem.

Conf. Senec. dentat. Jacq. Collect. 5. t. 6. f. 2.

Cataplasmatidis forma externè applicatus An-

helminthicum constituit efficacissimum poeres omnes Ætnae incolas, ubi *Erva di S. Petru* vulgo dicitur. Habitat etiam prope Nicosiam a la Madonna dell' Itria, et ad ripas Simeti fluminis prope Paternò.

75. *Seriola uniflora*: foliis radicalibus, runcinato-pinnatifidis, petiolatis, glabris; caule adscendente uniflora.

Hydracium Ætnense, minimum, *Dentis Leonis* foliis obtusis *Cup. Hort. Cath. p. 96. Panph. 2. l. 190.*

Radix longissimè descendens, ramosa, fusca. Folia omnia radicalia, in coespitem congesta, angusta, depressa, petiolata, glabra, pilis raris persepè ciliata, lyrato-pinnatifida, runcinata, lobis acutis denticulatis, terminali subromboideo. Scapi radicales, spitamei, graciles, adscendentes, simplices, uniflori, purpurascens, infernè hirsuti, supernè bracteolati, bracteolis lineari-subulatis, appressis, apice fuculentibus. Flores parvi, citrini, ante florescentiam cernui. Calyx simplex etsi

squamis 1-3 caulinis similibus ad basin quandoque cinctus, ferè pruinosis propter villos brevissimos, sub lente tantum conspicuos quibus conspersus. Receptaculum paleaceum, paleis calyce paulo longioribus, apice subulatis. Semina parum incurva, striata. Pappus sessilis, plumosus, uniformis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Habitat in acervis arenarum Regionis apertaë M. Ætnæ.

76. *Seriola Ætnensis*: hirsuta; foliis obovatis, subdentatis.

Seriola Ætnensis Sp. pl. 1130. — Bertol. Pl. Gen. p. 105. — Desf. Atl. 2. p. 237. — Lam. Illustr. t. 656. f. 1. — Gaertn. Fruct. 2. p. 370. t. 59.

Seriola urens All. Ped. 1. p. 230. t. 29. f. 1.

Hieracium medium, Lactucae folio, villisum, Pulmonariæ Gallicæ flore Bon. t. 150. — Cup. Panph. 2. t. 3. — Hort. Cath. p. 95.

Variat foliis integris et sinuatis.

Frequens in Ætna, & in nostris montibus.

77. *Seriola Allatae*: foliis radicalibus, spathulatis, dentatis, pilosis; caule adscendente, glabro; pappo stipitato.

T. 7. Herba glauca, Andrialae (Crep. L.) nemausensis facie. Radix brevis, fusca, subpre-morsa, crassitie pinnae anserinae, fibrillas longas, tortuosas exerens. Folia omnia radicalia, in orbem disposita, depressa, pilosa, molliuscula, spatulata, in petiolum decurrentia, deatato-sinuata. Caules a semipede ad quindecim pollices usque alti, tenues, adscendentes, ramosi, striati, basi tantum scabri, ad divisionem ramorum et flores versus squamati. Flores lutei, solitarii, terminales, uno alterove laterali abortivo, minimo. Calyx vix imbricatus, foliolis carinâ hirsutis. Semina purpurea, striata, rugosa, apice in pedicellum scabrum attenuata. Receptaculum paleaceum, paleis deciduis, membranaceis, apice subulatis, calyce longioribus. Pappus plumosus, stipitatus, unifornis.

Auspiciis Illustrissimi Equitis, Villafrancae

Principis, D. JOSEPHI ALLIATA, qui Botanicæ studium nunc inter nos augeat atque promoveat, et inter Clarissimos Majores suos illum refert, qui una cum Catholice Principis pecuniam et operam ad conficiendum Panphyton Cupaneum contulit.

Habitat in Ætnæ sylvis et ad sepes umbrosas.

78. *Silene hirsuta*: floribus racemosis secundis; calycibus hirsutissimis; petalis bifidis.

Silene hirsuta *Poiret. It. 2. p. 163. — Dict. Enc. VI. p. 169.*

Silene hispida *Desf. Atl. 1. p. 342.*

Lychnis alpina, noctiflora, longis calycibus hirsutis, flore collecto *Cup. Panph. 1. t. 87. — Bon. t. 175.*

Reperi in cultis prope Catanam.

Habitat in Ætnæ arenosis aridis.

79. *Silene sedoides*: pubescens, viscosa, humillima; caule dichotomo; foliis carnosissimis, imis spathulatis; petalis emarginatis.

Silene sedoides *Willd. Sp. pl. 2. p. 703. —*

Poiret Dict. Enc. 7. p. 180. — Desf. Atl. 2. adden.
p. 449. — Jacq. Collect. 5. p. 112. t. 14. f. 1.

Lychnis omnium minima e Monte Argentario Bocc. Sic. p. 24. t. 12. f. 4.

Lychnis marina pumila viscosa alba Alsine folia polyflora Bonan. t. 144. — Cup. Panph. 1. t. 60.

Lychnis marina, pusilla, Alsines folio crasso, minori, glutinoso, polyanthos Cup. Hort. Cath. p. 119.

Habitat prope Catanam in rupibus ad maris littora a l' Ognina e a lu Signuri asciatu.

80. *Silene nicaensis*: hirsuta, viscosa; foliis carnosius; superioribus linearibus, canaliculatis, acutis, inferioribus lanceolatis; petalis semibifidis; capsula apice sexentata.

Silene nicaensis All. Ped. 2. p. 81. t. 44. f. 2.

Lychnis marina floribus, candidis, subtus purpureis, Auriculæ muris foliis Cup. Panph. 1. t. 158.

Lychnis marina, alba, aversâ parte rubra, viscosa, hirsuta, Auriculæ muris fo-

lio crasso, latiusculo, repando *Cup. Hort. Cath.*
p. 118. t. 1. f. 1. g. 1. h. 1. i. 1. j. 1. k. 1. l. 1. m. 1. n. 1. o. 1. p. 1. q. 1. r. 1. s. 1. t. 1. u. 1. v. 1. w. 1. x. 1. y. 1. z. 1.

Glauca, superiori parte viscidiuscula, pilis hirsuta patentibus, articulatis.

Radix longissimè descendens, subramosa, alba. Caulis erectus, teres, articulis inferioribus tumidis, ad basin ramosus, ramis patentibus, adscendentibus. Folia carnosa, connata, infernè ciliata, decussata; superiora lineari-oblonga, acuta, canaliculata, inferiora elliptico-lanceolata. Racemus terminalis, dichotomus, floribus pedunculatis, alternis fasciculatis, sub diu solis involutis atque nutantibus, intermedio ex dichotomia longe pedunculato. Calyx tubo corollae brevior, costis decem e viridi dilutè purpurascentibus, maturascente capsulâ clavatus, apice 5dentatus, dentibus acutis, ciliatis. Petala semibifida, laciniis obtusis, integerrimis, fauce denticulis obtusis coronata, intus alba, extus e viridi-livido pururascentia. Antherae virides cum stylis interiori latere pubescentibus exertae. Capsula

ovata, erecta, intra calycem pedicellata, apice
sexdentata. Semina laevia, reniformia, lutea.

Habitat in arenosis maritimis prope Ca-
tanam, Messanam, et Carenim.

81. *Stipa tortilis*: paniculâ spicatâ, basi involutâ;
corollae valvulâ exteriore villosâ; aristis con-
tortis, inferne villosis.

Stipa tortilis Desf. *Atl.* 1. p. 997. 81. f. 1. —

Poir. *Dict. Enc.* 7. p. 450.

Spartium spicâ et setulis tenuissimis,
caudam aequinam imitantibus *Boc.* *Mus.* 1. 97.

Scheuchz. *Agrost.* p. 152.

Habitat in Ætna et etiam prope Panor-
mum ad aggeres.

82. *Sisymbrium vimineum*: subcaule glabris, hyra-
tis, laevibus; scapis adscendentibus; floribus
minutis.

Sisymbrium vimineum *Sp.* pl. 919.

Eruca pumila, sicula, *Bursae pastoris* fo-
lio *Boc.* *Sic.* 19. 1. 10. — *Bonan.* 1. 45. — *Cup.*
Panph. 1. 1. 34.

Eruca minor Iberidis folio *Cup.* *Panph.* 1.

*Eruca parva Iberidis folio sicula Cup.
Panph. 1. t. 59.*

*Eruca sylvestris, minor, lutea, Bursae Pa-
storis folio Cup. Hort. Cath. p. 96.*

*Eruca Salemitana Iberidis folio Hort. Cath.
Bon. t. 46. — Hort. Cath. p. 70.*

*Eruca minima, Monspessulana, flore luteo,
siliquâ unciam longâ Chabr. Sciagr. 276.*

*Eruca minimo flore Monspeliensis J. B.
Hist. 2. p. 862.*

*Planta palmaris, glabra, odore, et sapore
Erucae.*

Radix alba, simplex, attenuata, perpen-
dicularis. Folia radicalia in rosulam disposi-
ta, viridia, subtus pallida, lyrato-pinnatifida,
vel integra, lobis brevibus, obtusis, dentatis.
Caules graciles, decumbentes, plerumque sim-
plices, nonnunquam basi ramosi atque foliosi,
foliis tunc radicalibus omnino conformibus;
Flores parvi, lutei in racemo subinde elonga-
to, laxo, subflexuoso. Calyx erectus vel pa-
tulus, basi luteo coloratus, apice viridis. Co-

rolla calyce longior, Stamina tetradynama cum glandulâ nectariferâ inter breviora et pistillum, interque longiora et calycem, Siliquae patentes, compressae, obsolete quadrangulae, petiolatae, Stylus brevis. Stigma capitatum, oculo armato pubescens.

Reperi in Montibus S. Martini *all' Occhio* inter vineas.

83. *Targionia sphaerocarpos*: calycibus apice perforatis, univalvibus; fructificationibus aggregatis.

Targionia sphaerocarpos *Gmelin Syst. nat.*

9. p. 1353. — *Savi Pis. 2. p. 463.*

Sphaerocarpos minima terrestris *Mich.*

Gen. 4. t. 3. f. 2.

Frons circumscriptione orbiculata, sesquiuncialis circiter diametri, terrae instrata, tenuissima, pellucida, dilute viridis, supra glomerulo fructificationis obsita, subtus fibrillis albis radicans, margine libero, undulato. Calyces sessiles, inflati, turbinati, confertim, stipatimque aggregati, univalves, apice pertusi, frondi primum concolori, subinde

purpureo-fucescentes. Capsulae fundo calycis insertae, sphaericae, solitariae vel binae, seminibus repletæ.

In Ætnæ reperi aggeribus umbrosis.

84. *Targionia hypophylla*: calycibus bivalvibus; fructificationibus solitariis.

Targionia hypophylla Sp. pl. 1603. — Viviani *Fragm. Ital. Ec.* p. 193. — Lam. *Illustr.* t. 877. — *All. Ped.* 2. p. 311.

Targionia minima et vulgaris Mich. Gen.

3. 2. 3.

Lichen alter, acaulis, hypophyllocarpus Col.

Ephrs. 1. p. 331. t. 333.

Habitat in Ætnæ rupibus rimisque petrarum humidis.

85. *Tillea muscosa*: procumbens, floribus trifidis.

Tillea muscosa Sp. pl. 186. — Lam. *Illustr.* t. 90. f. 2.

Tillea muscosa, annua, perfoliata Mich. Gen. 22. t. 20.

Poligonum muscosum minimum Bocc. Sic. pag. 56. t. 29.

Sempervivum omnium, minimum, repens,
muscosum, Polygoni facie *Bocc. Mus. 2. p. 36.*

2. 22. *et al. Mus. 2. p. 36.*

Sedum, minimum, muscosum, folio tenuis-
simo, rubens *Cup. Hort. Cat. p. 199.*

Habitat prope Catanam et Panormum in
aggeribus.

86. *Thymus acinos*: verticillis sexfloris, peduncu-
lis simplicibus; caule adscendente, ramoso;
foliis acutis, serratis; calyce gibboso.

Thymus acinos Sp. pl. 826. — Curt. Lond. Ic.

Calamintha arvensis Savi Pis. 2. p. 62.

Acinos multis J. B. Hist. 3. p. 259.

Clinopodium Origano simile Cup. Hort.

Cath. p. 53.

In arenosis Ætnæ sylvaticis.

87. *Trifolium incarnatum*: spicis villosis, oblon-
gis, obtusis, aphyllis; foliolis subrotundis
crenatis.

*Trifolium incarnatum Sp. pl. 1083. — Sa-
vi Pis. 2. p. 152. — All. Ped. 1. p. 305. — Desf.*

Atl. 2. p. 196.

Lagopus major folio trifolii *Dod. Pempt.* 577.

Lagopus maximus Lobelii *Cluss. Hist.* 2. p. 246.

*Trifolium album, incarnatum, spicatum, si-
ve Lagopus maximus* *J. B. Hist.* 2. p. 376. — *Cup.
Hort. Cath.* 217.

*Trifolium alopecurum, latifolium, spicâ
longâ* *Barrel. Ic.* 697.

Habitat in *Ætnae arenosis umbratis* prope *S. Niccolò dell' Arena*.

88. *Trifolium lappaceum*: capitulis subglobosis, hispidis, dentibus calycinis corollâ longioribus; caule diffuso; foliolis cuneiformibus, retusis.

Trifolium lappaceum *Sp. pl.* 1082. — *Savi Duo Cent. p.* 144 — *All. Ped.* 1. p. 304.

*Trifolium nemorosum, capite ovato, vil-
loso, rubescente,* *Barr. Ic.* 871.

Trifolium capitulo glomerato, rigido *J. B. Hist.* 2. p. 378.

Habitat inter segetes prope *Catanam, Mes-
sanam &c.*

89. *Trifolium Cherleri*: capitulis globosis, terminalibus, bracteâ rotundatâ subcalyculatis; uenâ

tribus calycinis setaceis, villosissimis; caulibus procumbentibus.

Trifolium Cherleri *Sp. pl.* 1081. — *Savi Duo Cent. p.* 141. — *All. Ped.* 1. *p.* 305. — *Desf. Atl.* 2. *p.* 197.

Trifolium glomerulis personatae Cherleri
J. B. Hist. 2. *p.* 377.

Lagopus minor, supinus, molli et compresso capite *Barrel. Ic.* 859

Trifolium globosum repens *C. B. P. Cup. Hort. Cath. p.* 215.

Habitat in arenosis maritimis propè Carenim. *P. Russo.*

90. *Trifolium glomeratum*: capitulis hemisphaericis, sessilibus, lateralibus, glabris; dentibus calycinis cordatis, reflexis, venosis.

Trifolium glomeratum *Sp. pl.* 1084. — *Savi Pis.* 2. *p.* 157. — *All. Ped.* 1. *p.* 306. — *Desf. Atl.* 2. *p.* 200. — *Curt. Lond. Ic.*

Trifolium cum glomerulis ad caulium nodos rotundis *Pluk. Phyt. t.* 113. *f.* 5.

Trifolium arvense supinum verticillatum
Barrel. Ic. 882.

Trifolium Epithymi capitulis inter genicula annuum *Cup. Hort. Cath. p. 216. et Suppl. Atl. p. 90.*

Trifolium huntii jacens *Epithymi* fructu
Cup. Panph. 2. t. 123.

Habitat in *Ætnae* pascuis.

91. *Trifolium scabrum*: capitulis sessilibus latera-
libus ovatis, dentibus calycinis inaequalibus
persistentibus rigidis recurvis.

Trifolium scabrum *Sp. pl. 1084.* — *Curt.*
London. Ic. — Savi Duo Cent. p. 143. — All. Ped. I.
p. 306. — Desf. Atl. 2. p. 199.

Trifolium cujus caules ex geniculis glo-
merulos oblongos proferunt *J. B. Hist. 2. p. 373.*

Trifolium flosculis albis in glomerulis
oblongis, asperis, cauliculis proximè adnatis
Vaill. Paris. t. 33. f. 1.

Trifolium minus, capite subrotundo, par-
vo, albo et echinato *Barrel. Ic. t. 870.*

Trifolium capitulo oblongo aspero *C. B. P.*
Cup. Hort. Cath. p. 216.

Habitat in *Ætnae* campis arenosis.

92. *Trifolium maritimum*: spicis pilosis, globosis, dentibus calycinis foliaceis, demum patentibus; stipulis lanceolatis; foliolis obovatis.

Trifolium maritimum *Smith. Brit.* 2. p. 786.

Trifolium rigidum *Savi Pis.* 2. p. 154.

Trifolium irregulare *Lam. et Dec. Fl. Gal.* 4. p. 531.

Trifolium stellatum glabrum *Pluk. Phyt.* 1. 113. f. 4.

Habitat in palustribus maritimis propè Catanam a Turri d'addegra.

93. *Trifolium suffocatum*: capitulis sessilibus lateralibus subrotundis glabriusculis, dentibus calycinis lanceolatis acutis recurvis, corollâ longioribus.

Trifolium suffocatum *Mantis.* 2. 276. — *Smith Brit.* 2. p. 790. — *Jacq. Hort.* 1. 60.

Medica minor terrae adpressa, totâ superficie ad nodos echinata *Cup. Panph.* 1. 1. 208. *Hort. Cath.* p. 139.

Habitat in Ætnæ pascuis siccioribus.

94. *Trifolium spumosum*: capitulis ovatis, calyci-

bus fructiferis ovatis ventricosis glabris, den-
tibus setaceis recurvis; involucris universali-
bus membranaceis pentaphyllis; leguminibus
subtetraspermis.

Trifolium spumosum *Sp. pl.* 1085.

Trifolium apulum, annuum, rotundifo-
lium, glabrum, foliis maculâ albâ notatis,
flore purpurascente, calyce vesicario *Till. Hort.*
Pis. 2. 49. f. 4.

Trifolium caule nudo glomerulis glabris
L. Bauh. Hist. 2. p. 379.

Trifolium capitulo spumoso aspero majus
C. B. P. Cup. Hort. Cath. p. 215.

Habitat in Ætnæ pascuis.

95. *Trifolium agrarium*: spicis ovalibus imbrica-
tis, vexillis deflexis persistentibus sulcatis;
caulibus diffusis; foliolis obovatis.

Trifolium agrarium *Sp. pl.* 1087. — *Savi*
Pis. 2. p. 172, et ap. *Diar. Pisatom.* VI. n. 18. —

Cur. Lond. Ic. — *Pollich Pal.* 2. p. 342.

Trifolium procumbens *Smith Brit.* 2. p. 792.

Fl. Dan. 1. 796.

Melilotus agraria Desf. Atlas. p. 193.

Trifolium lupulinum Riv. Tetrap. Irr.

t. 10. f. 1.

.023

Melilotus qui Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli vel. agrarium Vaill. Paris.

t. 22. f. 3.

Trifolium agrarium luteum capitulo Lupuli majus Cap. Hort. Cath. p. 217.

Frequens in Ætnae pascuis, pratisque.

96. Triticum hispanicum: spicâ secundâ, simplici; spiculis subsexfloris, aristatis, calycibus multatis.

Triticum hispanicum Mant. 325. — Reich. Syst. pl. 1. p. 240. n. 8. — Will. Sp. pl. 1. p. 479.

Triticum festucoides Bert. Pl. Gen. p. 25.

Festuca maritima Sp. pl. 110. excl. Scheuchz. syn.

Reperi in Ætnae collibus arenosis præcipuè propè S. Niccolò dell' Arena.

97. Triticum repens: calycibus subquinquefloris flosculisque acutis, foliis planis, radice repente.

Triticum repens Sp. pl. 128. — Savi Pis. 1.

p. 148. et Mat. Med. 1. 36. — All. Ped. 2. p. 257.
Leers. Herb. 45. 1. 12. f. 3. — Schreb. Gram.
1. 26.

Gramen caninum arvense sive gramen Dio-
 scoridis *Scheuchz. Agrost. p. 5.*

In Sicilia haud obvium.

Reperi in cultis propè Catanam.

98. *Valeriana calcitrapa*: floribus monandris foliis
 bipinnatifidis.

Valeriana calcitrapa Sp. pl. 44. — Sav.
Duo Cent. p. 9. — Desf. Atl. 1. p. 28. — All.
Ped. 1. p. 1.

Valeriana annua sive aestiva Clus. Hist.
2. p. 54.

• *Valeriana foliis Calcitrapae C. B. P. Cup.*
Suppl. atl. p. 91. et Hort. Cath. p. 276.

Habitat in Ætna.

99. *Vicia narbonensis*: leguminibus sessilibus;
 compressis, subternis, margine ciliatis; fo-
 liolis obovatis truncatis, stipulis dentatis.

Vicia narbonensis Sp. pl. 1038. — All. Ped.
p. 327. Desf. Atl. 2. p. 166.

Vicia serratifolia Jacq. *Austr. app.* 3. 8.

Bona sylvestris Dod. *Pempt.* 516.

Vicia narbonensis, maxima, fructu rotundo, atro, foliis serratis *Cup. Hort. Cath.* p. 229.

Habitat in Ætnæ cultis.

100. *Vicia pannonica*; leguminibus pedunculatis subternis vexillisque pilosis, stipulis lanceolatis notatis.

Vicia pannonica Jacq. *Austr.* 4. 34. — *Wild.*

Sp. pl. 3. p. 1407.

Vicia sylvestris albo flore *Cus. Hist.* 2. p. 235.

Vicia sylvestris hirsuta incana flore purpureo *Cup. Suppl. alt.* p. 93.

Vicia sylvestris hirsuta incana *Cup. Hort. Cath.* p. 229.

Habitat in Ætnæ pascuis, pratisque

F I N I S

DABAM PANORMI DIE 2. DECEM: 1807.

ERRATA ET EMENDANDA.

Pagi 7. lin. 6. addde n. 7.

10. — 10. praecassorres *lege* praecasso

14. — 18. subirsutá *lege* subirsutá

24. — 1. leondontoides *lege* leontodontoides

25. — 14. Capsulá *lege* Capsula

29. — 6. subtu *lege* subtus

36. — 1. Hesperis *lege* Hesperis

31. — 22. areneoso *lege* araneoso

36. — 16. paginaodia *lege* paginâ

42. — 18. laevitet *lege* laeviger

46. — 8. Epistura *lege* Epiti


51. — 10. addde n. 72.


54. — 1. enoni 72. *lege* 73.

52. — 9. n. 72. *lege* 74.

59. — 15. sexentata *lege* sexdentata









Anthemis fuscata



Anthemīs secundiramea



Marchantia glauca







Ophrys


tenthredinifera

Ophrys lutea








Orchis undulatifolia~




Seriola Alliata.









3 5185 00110 73

